

合類醫問學入門

十六

附骨疽
一切瘡毒
以上一
以房
...

六

番外書冊

庫文閣內
函 號 架
三〇二函
六架

庫文閣內
函 號 架
九九函
八架

內閣文庫	
番號	和 37848
冊數	17 (16)
函號	195 194



合類李挺先生醫學入門外集卷之十六

丹州栢原 淡室 八尾玄長 新編

外科上

癰疽總論

脈

癰疽脈數浮陽沉陰浮數不熱但惡寒侵若知痛處急灸或

針洪數病進將有膿滲滑實緊促內消可禁宜托裏者脈虛

濡遲或孔瀦微潰後亦宜長緩易治短散則危結促代見必

死無疑脈浮數帶弦宜發熱而反惡寒或胸煩不知痛處或

陽易治不數沉微者發熱急宜灸或針浮數發熱而痛者屬

不淫不沉則為在經諸瀦者屬陰難治又浮為在表沉為在裏

實數促者可以下之將瀦已潰數者裏亦有膿結也未潰脈滑

益托裏長緩易治者胃氣盛也短散結代者元氣虛也宜大抵

未潰宜見諸陽脈已潰宜見諸陰脈後得之則宜促脈未潰

氣血帶瀦故緊多則瀦孔主亡血瀦後得之則宜促脈未潰

瀦則氣衰也

癰疽毒要氣血勝內外因皆濕熱凝癰者壅也為陽屬六腑



騰於外其發暴而所患浮淺不傷筋骨疽者沮也為陰屬
 臟毒攻於內其發緩而所患沉深傷筋蝕骨凡年壯氣血勝
 毒則順年老毒勝氣血則險有內因飲食積毒者經曰膏粱
 之變足生大疔榮氣不從逆於肉理榮氣即胃氣胃和則榮
 衛順而滋養皮膚膏粱金石厚衣烘被以致蘊熱臟腑濕熱
 聚下燒燥腎水陰火熾盛八脉沸騰經隧凝滯故水穀精微
 不能上行陽道反逆聚肉之腠理而成癰有外感風寒濕蘊
 毒者經曰地之濕氣感則害人皮肉又曰諸癰腫筋攣骨痛
 者此寒氣之腫八風之變也蓋風濕外侵鬱久為熱自膀胱
 左遷移熱小腸小腸移熱於膽風性上衝瘡形高色赤作痛
 小則為癰大則為癰而已非若疽之自裏也有因心氣鬱結
 饑飽勞役房室過度水竭火炎痰凝氣滯也成所謂相火能
 為瘡瘍諸痛痒瘡瘍皆屬心火是也因火有君相瘡分微甚
 或鬱痛而不甚腫或虛腫而不甚痛雖然病該三因總皆濕
 熱丹溪云人身血行脉中氣行脉外氣血周流不息惟寒濕
 搏之則凝滯而行遲火熱搏之則沸騰而行速氣為邪鬱津

液為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽而為癰
 血為邪鬱隧道或溢或結積久溢出血外氣為之亂此陽滯
 於陰而為疽蓋陽氣無形陰血有質必濕熱泣血而後發為
 癰疽故局方曰癰疽皆熱勝血也又曰一熱相搏熱化為膿
 蓋熱非濕則不能腐壞肌肉為膿譬如夏熱諸物皆不壞爛
 壞爛者交秋濕熱大行之際此理甚明

純陽焮赤潰斂易純陰色黯全不夜半陰半陽腫痛慢用藥回
 陽乃可生癰疽有大而愈者有微如豆而死者陽發初起皮薄
 作熱色赤焮腫疼痛潰後肉色紅活此為外發更加身健能
 食發熱便秘脉數有力為純陽易治陰發初起皮厚不熱色
 黯微種硬如牛皮不痛階軟不作膿不潰微開潰破後肉色
 紫黑此為內發未潰臟腑已前壞爛更加身倦少食不熱便
 利脉軟無力為純陰不治又有半陰半陽似腫非腫似痛非
 痛似赤非赤似潰非潰脉數無力如陽多陰少用藥比裏變
 陽者生陰多陽少用藥托亦不起投陰必死就中尤以有熱
 無熱為死生妙訣蓋陽症有熱則氣血行而生肌陰症

則氣血帶而不斂，遇有執熱，以不可退，執但宜溫藥清滲。
小瘧毒無熱亦不妨。

風則多痒，氣則痛，濕腫食則熱，寒增。瘧道雖止，發於一經，或兼
二經，多有挾風挾濕挾痰挾氣挾血挾陰虛等症。大較風氣

食三種俱以不換金正氣散方見加川芎、木香為主。兼風多
痒，加祛風藥，兼氣多痛，加調氣藥，兼食多發熱，執加消積藥。

兼濕多腫，加滲濕藥。又云：執瘧，瘧痛，虛瘧，淡白，風寒，瘧口帶
百○古方外因四氣，單用大黃半，生半執，甘草節等分，為末。

每空心酒下一匙，以利為度。○內因七情，單用遠志為末，酒
調二錢，澄清服。以香敷患處。○不內外因，金石炙燔房勞國

老膏方見懸癰一切執瘧，槐花酒方見治方。
藥毒堅硬有如石，金石藥毒則堅硬如石，不痛宜甘草黑豆煎

湯解之。
虛瘦重着，怕潮蒸，虛勞瘦弱，榮衛不調，患處重着，如負石，然因
其有骨蒸潮也，治宜滋補，故不可用養命丹方見等香燥疎

泄之藥，亦不可適用。降火滯脾之藥，惟腎氣丸方見托裏散。

甚得其宜。自古方謂藥毒勞瘵，瘧疽極重。
近瘧生虫，近虛漏，近膏者多，冷久則化，血為虫，多痒，少痛，近虛

者多執，久則傳氣成漏，多痛，少痒。
細認八道屬何經：腦發屬督脈足，太陽經鬢發，手足少陽經，肩

發手足，太陽少陽經，頤發鬢發，足陽明經，腮發手陽明經，背

發中，屬督脈，餘皆足，太陽經，腋發手，太陽經，乳癰內，陽明外

少陽經，乳頭足，厥陰經，腎癰足，太陽經，外腎癰足，厥陰經，腿

發外足，三陽內足，三陰經，喉癰臍癰，任脈足，陽明經，穿膈發

督衝任，三脈，騎馬癰，囊癰，足，厥陰經，內疽，肺癰，手，太陰經，腸

癰，手，太陽陽明經，胃虛癰，足，陽明經，惟少陽少陰太陰多氣
少血，厥陰太陽多血，氣肉皆難平。惟手足，陽明氣血俱多。
分經用藥，則不犯經禁，病禁以致妄下妄汗，且瘡屬腎經者，
最重脾肺二經者，次之，他經者，又次之，腦乃諸陽所在，咽喉
飲食所通，腎命根所係，皆至險之地，又不可多着，又冬俗
方專圖人形瘡樣，而忽經絡，謬哉。

外因寒執... 表散... 因外感... 內無便瀉，阻隔外，自六

症腫痛雖甚，飲食如常，脈浮數，邪在表也。宜托裏微汗，以散之。如發腦項背，分黃連消毒散，尻臀分內托羌活湯，臂上白芷升麻湯，乳脅內托升麻湯，兩脇十味中和湯，腿外側內托酒煎湯，腿內近膝股內托芪柴湯。通用敗毒散，九味羌活湯。二方見辛熱手足太陰經分自汗浮腫流注四肢，附子六物湯，辛溫發熱。六味流氣飲，賽命丹。方見暑月內托復煎散寒月內托十宣散，或不換金正氣散丹溪治形實脈浮數，冬月背生紅腫，及胛骨下痛者，用桂麻各半湯。以上二方加生附酒柏瓜薑仁甘草節羌活青皮人參黃芩半夏姜煎服六貼而愈。此正內托法也。有謂瘡家身痛不可汗，汗之則發，瘡者邪不在表而誤汗也。

內熱痛秘急疎行 內傷飲食積毒者，腫痛異常，外無六經形症。內有便溺，阻隔口渴，煩燥脈沉實為邪在裏，急與寒涼攻裏。內疎黃連湯，瀉心湯，活命飲，四順清涼飲。方見熱者清熱消毒飲，加紫草或清心散。方見滲之。○內積熱毒，又感邪者，宜發表攻裏，五香連翹湯，防風通聖散，毒盛者解毒湯。二方見後

下神勞止濕盛者除濕丹 一方見

勞傷氣鬱無表裏邪在 中和衛榮毒因內傷虛損房勞鬱怒而發者，形雖腫痛，然六經之形症內無便溺之阻隔，知邪在經也，不可妄施汗下，只宜補形氣調經脈和榮衛，或專補脾胃可也。鬱怒者十味流氣飲，虛勞者托裏消毒散，內托復煎散，補中益氣湯。方見古人治癰以寒藥者，正治法也。治疽以熱藥者，從治法也。蓋藥性熱則開行，寒則疎泄，疽乃有形之物，非熱藥從治，豈能行之乎。此內托內疎止治從治之義也。

潰後托裏排膿毒膿盡肌肉自然平 潰後氣血大虛，惟恐毒陷，托裏之法，一日不可缺也。古方托裏散托裏清中湯托裏溫中湯托裏和中湯托裏建中湯托裏抑青湯托裏益黃湯托裏裏益氣湯，選用蓋托裏則氣血壯而脾胃盛，膿穢自排，毒氣自解，死肉自潰，新肉自生，瘡口自斂。若不務補托而誤用寒涼，反助邪火，膿多臭穢甚，則脈洪大渴，真氣虛而死矣。丹溪云：但見裏痛，參之脈症虛弱，更與滋補，乃可萬全，又不可

氣質_才實及參芪滿中帶_也也。但初潰時間有熱毒盛者，加消毒清劑，如發背搭有膜破穿心，必死。尤宜托裏，免致毒陷。托裏即護心也。若毒氣上攻，心神昏悶，欲嘔者，間服護心散以救之。如帶表邪，面赤等症，勢未甚起者，內托復煎散或內托十宣散暫服。若無熱毒表邪，但見穢氣觸犯，虛熱少食，不睡者，便進入參黃芪湯，但見膿多心煩，少睡者，便進聖愈湯。_{二方見外}但見脾虧氣弱，不能生肌收斂者，便進補中益氣湯。_{科通用}但見腎虛不能消潰收斂，或睡執作渴者，便進八味丸或腎氣丸。_{俱見}緊急不及作丸，太料煎服，預防救危。殆終，妙劑若不務本根而專用敷圍生肌之藥，則斂口太速，毒反內攻，或傍邊再發一癰者，有之。或愈後而惡症頓起，太命隨去者，有之。惟務內治而不貴外治者，為高。

外治初起灸最妙。形傷則痛，氣傷則腫，或先痛後腫，傷乎血先腫後痛，傷乎氣腫痛並攻，氣血俱傷皆因臟腑不和而非外治能調。古法隔蒜灸，法豆豉餅。_{俱見外}惟外傷成瘡者，不宜自內發者，痛則灸，至不痛不痛則灸，至痛時方住。早覺早灸，為佳。一日二十灸，十日活，三日四十灸，七日活，五日六十灸，四活，過七日則不可灸矣。其餘點割敷透，間有毒盛者，量用之則可。

針治

熱痛半軟針相當

癰疽毒氣已成，宜托裏以速其膿。膿成者，當驗其生熟淺深而針之。若腫高而軟者，發於血脉腫下而堅者，發於筋脉，肉色不變者，附於骨也。按之熱者，有膿不熱者，無膿。按之便痛者，膿淺。大按方痛者，膿深。按之陷而不起者，膿未成。按之而復起者，膿已成。按之都軟者，無膿。不痛者，血瘤。痛者，氣瘤。按之一邊軟者，有膿。若膿生而用針，氣血既泄，膿反難成。若膿熟而不針，腐潰益深，瘡口難斂。若瘡深而針淺，內膿不出，外血反泄，瘡淺而針深，內膿雖出，良肉受傷。元氣虛者，必先補而後針。其膿諸症自退。若瘡毒熾盛，中有肉黯者，宜內托脾胃。外塗單巴豆膏。_{見外科}令其黯處漸低，赤處漸高。六七日間，赤黯之處自有裂紋，如刀割狀。黯肉漸潰，當用披針利剪徐徐引去。若膿出肉腐，腫痛仍作，必內有筋間隔，宜再引之急補脾胃。不痛者，純用補藥，庶可不斂。若

施針刀，傷肉出血，斷之不止者，立危。其按針用馬、叩鉄爲一敷，圍點，非得已。人身氣血遇溫則散，遇寒則凝。敷寒涼閉塞，滕理氣凝，血凝舊肉不潰，新肉不生，則毒反內攻，難以療。

欬甚則不起，必內分陰陽，用藥外分陰陽。敷圍內外夾攻，藥氣相通，爲妙。純陽症內服，內服黃連湯，清熱消毒，飲之類外敷抑陽散。

見外科，純陰症內服，補中益氣湯，方見內傷，加姜附入酒煎外敷。抑陰散，見外科，○點，灰膏以去惡肉，藥線三品，銀子

二方見外科，以透膿管，皆欲敗腐盡，除不至侵蝕筋骨，非得已。科通用。

止痛，斂口，免開張，癰疽不可不痛，不可大痛。未潰前痛者，爲執

毒便秘，宜內踈黃連湯解毒湯，方見傷寒，作膿痛者，排之膿，痛者，針之已潰，膿出反痛者，虛也。氣虛四君子湯，方見脾胃，加歸芪

血虛四物湯，方見諸虛，加參芪氣血俱虛，托裏益氣湯，脾胃虛者，托裏和中湯，腎虛者，腎氣丸，方見諸虛，因登廁，犯穢氣，絀者，藥中加

乳香、芷芍之類，和之風寒逼者，加防風、桂枝之類，溫散之燥

者，潤之。濕者，道之泉，係瘀血惡肉，凝滯者，方可乳香止痛散

和之，方見外科，○瘡口不斂，由於肌肉不生，肌肉不生，由於腐肉不去，腐肉不去，由於脾胃不壯，氣血不旺，必以補托爲主

而佐以行經活血之藥，則肌肉受毒者，自生死者，自潰。又何待於點割耶？大要氣虛體倦，食少者，補中益氣湯，方見內傷，血但虛，十全大補湯，方見諸虛，或大痛，或不赤，或內膿不

潰，或外肉不腐者，氣血虛敗，桑枝灸法，方見外科，十全大補湯，加姜桂壯其陽氣，則四畔即消，瘡頭即腐，若脾胃虛弱，慢腫

不赤者，六君子湯，方見脾胃，倍白朮，若初起腫痛，或因尅代及入房，以致色黯而不痛者，乃陽脫變陰，急用古參附湯，方見諸虛，以

救之，間有血分虛熱者，瘡口肉色必赤，四物湯加山梔連翹，氣分虛熱煩渴者，竹葉黃芪湯，方見外科，要知瘡口難斂，或漸

大漸，開出血者，危，俗皆以腫痕所至爲暈，非真暈也。暈生於瘡口之畔，狀如紅筋，三暈三暈尚，可四暈五暈者，死。

洗能，洗毒，洗血氣，洗藥，踈通氣，膿血，揪聚之時，所賴朝夕

者，不葉石羔湯傷寒方見，腫痛發熱，大便秘澀者，四順清涼飲方見。

積熱，焮痛熾盛者，活命飲，膿水多者，聖愈湯方見，外胃傷內

亡津液者，錢氏白木散方見，腎水乾涸者，八味丸方見，有先

作渴，小便頻數而後患疽者，或愈後作渴，或舌黃乾硬，小便

頻數而後患疽者，尤其惡也，宜預服八味丸，補中益氣湯方見。

內傷以滋化源，可免是患，蓋癰疽未有，不因腎虛而作，切忌

知母黃柏損陽，則陰氣無由而生。○泄瀉因寒，京傷脾者，六

君子湯方見，加砂仁，或托裏建中湯，托裏溫中湯，脾虛下陷

者，補中益氣湯方見，吞二神丸方見，命門火衰者，八味丸方見。

諸虛料煎，吞四神丸方見，腎虛不固者，古姜附湯方見，加吳

萸五味子，太孔痛者，附子理中湯，四逆湯方見，凡癰疽嘔

瀉，腎脈虛者，死。○便秘因熱毒入臟，嘔噦心逆發熱，腫

結固宜通之，又有伏執，陽氣佛鬱而赤便秘者，為邪火在經

宜汗，以發之，潰後氣虛血涸便秘者，十全大補湯方見，或因

入房傷腎便秘者，加姜附以回陽氣，則大便自瀉，凡便秘能

食而肚腹不張者，切不可下，若腹痞脹而秘者，猪膽法用猪

膽一枚，煎去頭，入塩醋少許，以鴉管挿入膽中，灌穀道，內須

更自通。○小便淋瀝頻數，短少，或莖中澁痛，皆腎虛惡症，詳

淋瀝類。

潰後腫痛臭難當，膿血既泄，腫痛尤甚，膿色臭敗者，胃虛火盛

一惡也，人參黃芪湯方見，外或十全大補湯方見，加麥冬

五味子。

黑睛緊小，白青赤，目視不正，患睛緊小，白睛青赤，瞳人上視者，

肝腎陰虛而目條急，三惡也，腎氣丸料，或八物湯方見，俱

加炒山梔麥門冬五味子。

喘急恍惚喜臥床，喘粗短氣恍惚昏臥者，脾肺虛火四惡也，六

君子湯方見，加姜棗，或補中益氣湯方見，加麥門冬五味子，

心火剋肺，金人參平肺散方見，陰火傷肺，腎氣丸料，諸虛加

五味子煎服。

屬惡，肩背四肢重，肩背不便，四肢沉重者，脾腎虧損五惡也，補

中益氣湯方見，十全大補湯方見，俱加山藥山茱萸五味子，

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

食少嘔藥傷寒涼，不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱

六惡也。六君子湯方見加木香砂仁甚加附子，挾痰者，托裏清中湯，挾火者，托裏益黃湯。○抑論瘡腫時作嘔，熱毒攻心，漬時作嘔，陰虛潰後作嘔，脾虛如熱盛，焮痛活命飲護心散，作膿，掀痛，托裏消毒散，膿熱，脹痛，托裏散，或針以泄之，焮痛便秘者，內疎黃連湯，寒涼傷胃者，六君子湯加乾姜木香，木乘土位，加芍藥柴胡，胃腕停痰，加桔梗，脾虛自病，或水侮土，加益智仁砂仁，鬱結傷脾，加川芎山梔蒼木香附，濕氣侵胃，倍白朮白朮生肌，斂口，妙劑，又有吞酸觸穢作嘔者，仍宜補胃，聲嘶唇鼻變青色，面目四肢腫，且黃，脾肺俱虛，七惡也，補中益氣湯方見加姜麥，或六君子湯方見加炮姜，甚加附子，或十全大補湯方見加炮姜。

陽虛寒戰，腹疼甚，自汗，飢逆，雷鳴，腸陽虛，皆因誤服寒涼。後勞役，或吐瀉之後，或誤入房，夢遺，或外邪所乘，初則虛火假症，仍發熱，頭疼，良久寒戰，咬牙，腹痛，雷鳴，泄瀉，飢逆，自汗，盜汗，陽虛寒氣所乘之症，八惡也，急用托裏溫中湯，後用六君子湯，加附子，或加姜桂甚者，用大劑參芪歸朮，倍加姜附。

以手足溫為度

厥極發躁，欲坐，并暴然，變症，身反張，潰後發熱，惡寒，作渴，怔忡，睡臥不寧，陽衰陰盛，發躁，脈洪大，按之微細，或無此，陽虛極，暴然，牙關緊急，腰背反張，變為痊，痊陰縮，或無汗，惡寒，或有汗，不惡寒，九惡也，俱宜八味丸，料加參芪歸朮，大劑煎服。

陰虛，晡熱，夜不寐，消渴，便汚，血難藏，原稟瘦怯，或房慾竭精，或瘡出膿多，或誤汗下，以致日晡潮熱，口乾，作渴，夜寐不著，瘡出紫血，四物湯諸方見托裏益氣湯，腎氣丸諸方見主之。○便汚黑者，不治，使血瘀滯者，犀角地黃湯救之。傷寒○瘡瘍時，或愈後，口鼻吐血，衄牙，宜齟露，皆因瘡瘍出血，虛火動而錯經，妄行，當求經審其因而治之，肝熱則血妄行，四物湯加山梔牡丹皮黃芩白朮，肝虛則不能藏血，腎氣丸，心火不能主血，四物湯加炒黃連牡丹皮，木脾虛熱不能統血，四君子湯加炒山梔牡丹皮，脾經鬱結者，歸脾湯方見加五味子，脾肺氣虛者，補中益氣湯加五味子，氣血俱虛者，十全大補湯，陰火動者，腎氣丸加五味子，大凡失血過多，而見煩熱發渴等症。

勿論其脉急用單人參湯傷寒補之經云血生於氣苟非壯
 温參芪歸木之類以生心肝之血失不能愈若發熱脉大者死
 五善見三容易治七惡見四真惡瘡正傳以善為順惡為逆瘡
 瘍仍忌倒脂又增為九逆殊為有理

無名腫

又有一般無名腫非癰非疽非瘡非癩狀如惡瘡或瘰或劇各
 日無名腫毒隨其見症在表在裏在經用藥外以槐枝煎湯
 洗淨後以赤小豆與真白膠香黃連黃柏貝母硫黃糯米黃
 丹輕粉為末麻油調搽一切惡瘡人所不識者皆同

癰疽腫痛

癰疽癰也同方潤一寸至二寸為癰二寸至五寸為癰五寸
 至一尺為疽一尺至二尺為竟體疽未潰色紫黑堅硬已潰
 深陷如岩為癩四畔生如牛唇黑硬為癩無頭面色淡紅為
 癰是知腫起為癰沈潰為疽發出於外者為外發隱伏腸胃
 者為內疽癰比癩疽更輕癩癰多難治○癰多生乳脇脉
 跨全宜大補氣血脾胃及蠟礬丸方見外科通用護膜生肌其萬
 一○療癰見後週身部

活命飲 甘芍芷風歸天天花皂刺貝母隨金銀花乳陳沒藥太黃

穿甲酒煎宜

○活命飲 此藥不動臟腑不傷氣血凡一切癰毒瘡瘍未成
 者內消已成者即潰排膿止痛消毒之聖藥惟已潰者忌用

甘草節 赤芍 白芷 天花粉 貝母 乳香各一錢

防風 七分 歸尾 皂角刺 陳皮各一錢 金銀花 三錢

沒藥 五分 大黃 五錢 穿山甲 三片 用好酒瓦罐煎密封罐

日勿令泄氣煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒一二盃側臥
 而睡忌酸物鈇器如在背皂刺為君在腹白芷為君在四肢
 金銀花為君在胸加瓜蒌仁三錢疥瘡加紫葳河車草根三錢
 准便調者宜去太黃

麻扁竹涼

五香連翹湯 麝香乳丁沉香太黃通草寄生川獨活甘草升

○五香連翹湯 治一切積熱結核癰癧癰疽瘡癤

連翹 扁竹根 大黃 桑寄生 獨活 木通 升麻

丁香 錢各七 沉香 青木香 錢各二 生甘草 乳香

麝香 錢各半 每四錢水煎熟服以利惡毒為度一方有公

瀝芒硝隨熱輕重加減

內托復煎散地皮參為參苓桂黃芪兩防兩木歸甘草蒼朮先煎餘次之

○內托復煎散 治陰疽癰毒蘊結於中常服托裏健脾胃大緊
冬月內托宜十宣散夏月及有熱者宜此多服最妙

正 地骨皮 黃芩 白芍 人參 茯苓 肉桂 黃芪
防已 當歸 甘草 白朮 各一兩 防風 三兩 蒼朮 一升

先以水五碗煎蒼朮至三碗去渣入餘藥再煎至四盞取汁
終日飲之其查亦如前煎汁飲之

流氣參歸芪梗風木香枳為川芎桂槿芷朴蘇烏藥流注傷
寒不見縱

○十六味流氣飲 治無名惡腫癰疽等疾此表裏氣血藥也
非脈洪緩沉遲緊細者不宜用

人參 當歸 黃芪 桔梗 防風 木香 甘草
枳殼 芍藥 川芎 肉桂 槿柳 白芷 厚朴
紫蘇 烏藥 各等 水煎溫服方無槿柳肉桂有皂角刺

內托十宣散 參苓歸朴梗桂芎防芷草干味為末酒調之癰疽
加減如珍寶

○內托十宣散 治一切癰疽瘡癤已成者潰未成者散敗膿
自出無用手擠惡肉自去不犯針刀服藥後夜痛頓減排膿
生肌其効如神小兒痘疹亦宜用此托裏

人參 黃芪 當歸 厚朴 桔梗 肉桂 川芎
防風 白芷 甘草 各等分為末每三錢至五六錢不
飲酒者木香磨湯調下瘡愈服之尤佳或加忍冬藤尤妙如
天熱去桂加瓜蒌根赤茯苓

癰疽雖屬外科用藥却同內傷凡癰疽皆飲食七情房勞損傷
脾胃肝所致間有外邪相搏及小瘡瘍傳染亦皆因內有毒
以召之也是以薛立齋專用補中益氣湯內傷以補後天腎
氣凡諸虛以補先天中間雜症氣用四君子脾見血用四物
湯諸虛痰用二陳湯痰飲鬱用越麩丸瘡門一同內科惟初
起內托內消和解稱似傷寒故曰必通內科與儒而後可言
知外科也

合類八用卷十七 癰疽

托邪毒而不陷分經絡以用方腦背尻臂黃連羌活力厚

○黃連消毒散 治足太陽經分癰疽發於腦項或背腫勢外散熱毒癩發麻木不痛宜先灸之或痛而發熱宜服之

黃連 羌活 黃芩 黃柏 藜蘆 防已

桔梗 生地 知母 獨活 防風 歸尾

連翹 黃芪 蘇木 陳皮 澤瀉 人參

甘草 水煎服

○內托羌活湯 治足太陽經分癰疽發於尻臂堅硬腫痛大作兩尺脈緊無力 羌活 黃柏 黃芪 防風

藜蘆 歸尾 連翹 甘草 蒼木 陳皮

肉桂 水二盞酒一盞煎至一盞熱服

臂膊乳膺白芷升麻性涼

○白芷升麻湯 治手陽明經分臂上生癰此得八風之變也

白芷 升麻 桔梗 甘草 紅花 黃芪

酒芍 生芍 分二貼水酒各半煎服

○內托升麻湯 治兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子并

乳癰初起亦宜

葛根 升麻 連翹 黃芪 當歸 炙甘草

鼠粘子 肉桂 黃柏 水二盞酒一盞煎服

十味中和湯 治手足少陽經分發癰及時毒脈弦在半表

半裏者 石菖蒲 牛蒡子 羌活 川芎 防風 漏蘆

荊芥 麥門冬 前胡 甘草 各等分水煎服

八味逍遙散 治脾胃血虛有熱生癰或遍身瘙癢煩熱肢

體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾口舌生瘡耳內作

痛或發熱盜汗食少嗜臥或胸乳腹脹小便不利或手足少

陽火盛內熱肺熱月經不調寒熱往來或脇乳腫痛耳下結

核等症 當歸 芍藥 茯苓 白朮 柴胡 甘草

牡丹 炒山梔 水煎服如頭目不清加川芎五分

蔓荊子七分

太陰腿內膝足莖柴附子湯入酒

○內托芪柴湯 治足太陰厥陰經分瘡生腿內近膝股或癰

或附骨疽初起腫痛勢大黃芪二錢柴胡一錢羌活五分

連翹二錢土瓜根一酒錢歸尾七分肉桂三分生地

黃柏各二錢水二盞酒一盞煎服

○附子六物湯 治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘急

自汗短氣小便不利手足或時浮腫兼治五痺

附子 防已 肉桂 茯苓 白朮 甘草

姜煎服

○少陰腿外臃脛內托黃芪酒煎湯

○內托酒煎湯 治足少陰經分癰生腿外側或因寒濕得附

骨疽或微侵足陽明經分堅硬腫痛不能行

黃芪 歸尾 柴胡 連翹 肉桂 大力子

白芷 歸尾 柴胡 連翹 肉桂 大力子 水酒各半煎服

○瀉心護心主痛瘡

○瀉心湯 治癰疽瘡毒腫盛發躁煩渴脈洪實而數

大黃 黃連 黃芩 山梔 漏蘆 澤蘭 連翹

蘇木 量虛實水煎服

○護心散 治諸發背疔腫會經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘

嗽泄瀉而痛喉舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥最能反

出毒氣不致內陷發後亦可間服此藥加山枇杷皮末二錢

又可外敷止痛 菜豆粉 四錢 乳香 一錢 為末甘草煎湯

調時時細呷瘡已沈晦加肉桂二錢當歸一錢煎湯調服

○瀉肝清肝肝主瘡瘍

○龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱或癰癰便毒下疳懸癰腫焮作

痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺腫脹或出膿水

龍膽草 澤瀉 車前子 木通 生地 當歸尾

山梔 黃芩 甘草 水煎

○清肝湯 治肝經血虛而有怒火

川芎 當歸 白芍 柴胡 山梔

牡丹皮 水煎服

○清肝解鬱湯 治癰疽因肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血

乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經氣血不和之症並皆治之

當歸 白朮各一錢 人參 柴胡 牡丹皮 陳皮
川芎各八分 茯苓 貝母 芍藥 熟地 山梔各一錢
甘草五分 水煎服

○清肝益榮湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項
腫乳脇肋作痛或作癩子并一切肝火血症

白朮二錢 熟地一錢 當歸 山梔 木瓜 茯苓各一錢
龍膽草八分 川芎 芍藥 柴胡各七分 甘草五分 水煎服

○梔子清肝湯 治三焦及足少陽經血虛肝火風熱耳內作
痒或生瘡出水或頸項胸乳等處作痛或寒熱嘔甚自汗口
苦或目唇搐動等症

山梔 柴胡 牡丹皮各一錢 茯苓
川芎 芍藥 當歸 牛蒡子各七分 甘草五分 水煎服

○柴胡清肝湯 治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火以致頸項耳
前後或胸乳脇肋作痛或肺熱不食寒熱往來嘔吐泄瀉等症

柴胡 山梔各一錢 黃芩 人參 川芎各一錢 連翹
桔梗各八分 甘草五分 水煎服

惟未發為氣血實厥當奪泄以瀉其壅盛內疎清熱消毒敗毒
解毒打膿追膿潰膿善

○內疎黃連湯 治熱毒在臟癰疽腫硬發熱嘔吐大便秘結
脈洪而實屬純陽症

連翹二錢 大黃一錢 黃連 黃芩 山梔 薄荷 木香
檳榔 芍藥 當歸 桔梗 甘草各一錢 水煎服量

○清熱消毒飲 治癰疽陽症腫痛發寒熱或拘急頭痛屬
實用之一方去木檳加金銀花牡丹皮

金銀花二錢 芍藥 川芎 生地各一錢 當歸 黃連
山梔 連翹 甘草各一錢 水煎服

○人參敗毒散 治一切癰疽喉痛發寒熱或拘急頭痛屬
表症宜用

黃連解毒湯方見 治癰疽喉痛煩燥飲冷脈洪數或在言等症
打膿散 治諸癰腫不放膿出

木鱉子實精七箇 金銀花 黃芩 黃連 黃柏
歸尾各一錢 大黃一兩 甘草節 穿山甲各七分 芒硝三錢

水煎五更服太便見膿小使見血為効

○追膿化毒散 治一切癰疽瘰癧便毒瘰癧火胸紫初起下以

平之 穿山甲 當歸 大黃 各三玄明粉 姜蠶 乳香 沒藥 各半 白芷 二錢 水煎服并吞

○潰膿散 治癰疽發背疔瘡癰癧對口乳癰男婦便毒魚口

已成未成皆効 白芷 上中六二錢 下六一錢 穿山甲 上三片 中二片 乳香 上八錢 中六錢 下四錢

姜蠶 上三錢 中二錢 下二錢 甘草節 上三錢 中二錢 下二錢

為末先以當歸煎酒將瘡洗過如瘡在頭心上者服四錢四分

分心膈中者服三錢七分臍足下者服三錢半肚腹內陰者服四錢半俱用水酒各一盞煎調前未通口盡服如不足好

酒和之取利為度

惟已發為榮衛薄歟當補托以接其虛怯托裏清中溫中和中

建中抑青益黃益氣枳當

○托裏散 治癰疽氣血虛不能起發腐潰收斂或惡寒發熱

肌肉不生宜此補托

人參 黃芪 各二白木 陳皮 當歸 熟地 茯苓

芍藥 各半 甘草 一錢 水煎服如煖腫熱毒加黃連漫腫

氣虛倍參木表邪加羌活川芎表虛倍參芪內熱飲冷便秘

去參芪歸木加大黃內虛飲熱便秘倍參芪歸木寒熱飲冷

濁瀝肝熱去參芪加柴胡炒山梔不作膿膿不潰氣虛也加

參木桂腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥肉赤不斂血虛有

熱加熟地牡丹皮肉黯不斂陽氣虛寒也加參芪肉桂白斂

肉白不斂陽氣虛也膿多不斂氣血虛也俱倍參芪歸木漫

腫不痛肉死不潰脾虛甚也加參木姜附膿多帶赤血虛也

倍參木歸地忿怒補熱出血肝火血虛也加牡丹山梔熟地

面青脇脹出血肝虛不能藏也加山藥山茱萸五味子食少

體倦出血脾虛不能攝也倍參芪歸地鬱結少寐出血加遠

志酸棗仁茯神龍眼肉欲嘔作嘔或外搽內服寒涼或痛甚

或感外邪穢氣作嘔胃虛也加藿香參木少食腹痛腸鳴冷

瀉脾虛寒也加炮姜木香膿多作渴氣血虛也加熟地五味

子來門冬，莖痛溺淋，精內敗也。加山藥、山茱萸、澤瀉、勞役弱，赤氣下陷也。加升麻、柴胡、日晡頭痛眩暈，陰血虛也。加熟地、身熱惡衣，欲投木中，脈沉微細，氣脫發躁也。加姜、附肉、桂、朮、熱多、痰、脾血虛也。倍歸地、參朮、善思、體痛、不寐、盜汗、脾血虛也。加茯神、酸棗仁、寢寐汗出、腎氣虛也。加五味子、飲食汗出、胃氣虛也。加參朮、五味子、睡覺飽而盜汗、宿食也。加參朮、半夏、婦人勞怒、夜熱或譫或適、經行熱在血分也。加柴胡、生地、牡丹皮。

○托裏消毒散 治癰疽腫痛俱慢，色不甚赤，元氣虛弱，或行攻伐不能潰散者，宜用之。采成者，消已成者，潰又去腐生新之良劑也。加減同前，但虛弱及已潰者，去翹、芷、金銀花三味，消毒之藥。人參、黃芪、當歸、芍藥、白朮、茯苓、陳皮、錢一連翹、白芷、金銀花、甘草五分。水煎服。一方去連翹，加川芎、皂刺、乳香、沒藥。
○托裏清中湯 治癰疽脾胃虛弱，痰氣不清，飲食少思等症。人參、白朮、茯苓、陳皮、半夏、桔梗、甘草五分。

姜棗煎服

○托裏溫中湯 治癰疽陽氣虛寒，腸鳴切痛，大便澹泄，飢逆昏憤，此寒變內陷，緩不可救。

附子四錢、乾姜、羌活各三錢、益智仁、丁香、沉香、木香、茴香、陳皮各一寸、草二錢、姜煎服。
○托裏和中湯 治癰疽中氣虛弱，飲食少思，瘡不消散，或不腫痛，或潰而不斂等症。人參、白朮、茯苓、陳皮、半夏、炮姜、甘草五分。姜棗煎服。

○托裏建中湯 治癰疽元氣素虛，或因寒涼傷脾，損胃，飲食少思，或作嘔泄瀉等症。急服此藥，以健中氣。人參、白朮、茯苓、半夏、炮姜、甘草五分。姜棗煎服。

○托裏抑青湯 治癰疽脾胃虛弱，肝木所侮，以致飲食少思，或胸腹不利等症。人參、白朮、茯苓、陳皮、半夏、芍藥、柴胡、甘草五分。姜棗煎服。

○托裏益黃湯 治癰疽脾胃虛寒，水侮土，以致飲食少思，或

嘔吐泄瀉等症兼治癰疽六腑所傷中氣虛弱食少等症

人參 白朮 半夏 陳皮 川芎 香附 山炮
蒼朮各一錢 甘草五分 姜棗煎服

○托裏益氣湯 治癰腫硬肉色不變或腫熱或潰而不斂并一切血氣肉症 白朮二錢 人參 茯苓 貝母 陳皮

香附 芍藥 當歸 熟地各一錢 桔梗 甘草各五分

水煎服如口乾加五味子麥門冬寒熱往來加柴胡地骨皮膿清加黃芪膿多加川芎肌肉遲生加白斂肉桂

腦脛部

腦發五種

腦後頸後頭心發六腑陽毒好上蒸六腑陽毒聚頂惟太陽膀胱主之久積痰火濕熱上蒸於腦古謂發腦發鬢發眉發頤發背諸之五發至險凡眼不見瘡皆惡○有生於兩邊髮際穴者如有核宜取核以去病根○有生於腦心者四邊腫赤

連耳項不急治膿水從頭中而出血逆痰起不活○有生於頸後者瘡頭向上瘡尾向下形如蜂窠乃反症也瘡腫者急宜托裏散加升麻赤芍桔梗防毒攻心如瘡發或流入兩脅者不治○有生腦後對口者名曰天疽其狀大而色紫黑不急治熱入淵腋前傷在脈內薰肝肺十餘日而死○有在耳後一寸二分至命之處名曰發頤又曰銳毒凡頭上癰疽宜服降火化痰消腫托裏之藥不可針灸惟初起隔蒜灸之則可但艾炷宜小而少勢成者外敷南星膏方見或陰陽散方見

口古香柳散外科俱見若熱上蒸連頤而穿口必主穿喉而死

焮腫納冷真熱症 焮腫作痛煩渴好飲冷水宜解毒湯方見加

天花粉以除痰火濕熱或黃連消毒散方見當歸羌活湯清熱消毒飲活命飲方見選用

口乾飲熱腎虛情腫痛口乾作渴好飲熱湯為腎陽虛火熾宜托裏消毒散托裏益氣湯方見腎氣丸八味丸方見慢

腫微痛少食者補中益氣湯方見痰多者托裏清中湯方見

若心熱不潰不斂為陰精治洞名腦爛不治

合類入門卷十六

且夫疔疔疔活最靈

○當歸羌活湯 因膏梁熱鬱者宜貧窮寒濕者少用
當歸 酒炒 各二錢 酒栢 連翹 防風 羌活
甘草 山梔子 各一錢 獨活 藁本 各七錢 澤瀉 五分 水浸
良久入酒一匙煎熱服日三次三白盡六服却將藥清汁調
下木香檳榔末各三錢

頭瘡 風屑 禿瘡 軟癬

頭瘡風屑禿軟癬總是濕熱症稍輕

○頭瘡宜內服酒歸飲外用雄黃水銀各等分為末以臘月猪
脂半生半熟和勻洗淨敷之濕爛者用燕窠土黃栢為末乾
粉搽高者用黃蠟澄清同熬敷之

○頭上風屑白屑極痒宜內服單苦參凡火門下虛者薄荷茶
見食外用藜蘆煎湯避風洗頭候稍乾分調頭髮仍以藜蘆
末搽頭皮上稍怕緊縛兩日夜頭風亦効

○禿瘡初起白團班剝如癬上有白皮久則成痂遂至滿頭生

瘡中有膿孔細虫入裏不痛微痒經久不瘥宜內用通聖散
傷寒酒并除太黃別用酒炒共為末再用酒拌令乾每一錢
水煎服外用紅炭淬長流水洗去瘡痂再用淡豆豉一合炒
令煙起色焦屋塵一團飯飲調劑炭火煨令灰燼等分為末
入輕粉少許麻油調搽如有熱加黃連寒水石有木加枯礬
有虫加川椒麝香少許腫厚加消皮烟洞烟膠香爐蓋上香
膠如久不愈有虫者摩風膏方見加黃栢黃丹烟膠各一兩
一方用鹽烏魚頭燒灰麻油調搽

○軟癬用抱鷄卵殼燒存性入輕粉黃連減半為末清油調敷
外腎生瘡亦効愈而再作者用野蜂房二箇燒存性為末以
巴豆廿粒去殼煎清油二三沸去豆以清油調敷或枯礬亦
好多年不愈者用猪頭上毛猪頭上毛各一握燒存性尿尿
一粒為末清油調敷或加輕粉尤効如暑月生瘡用木槿花
搗爛敷之最効

頭瘡酒歸立化

○酒歸飲 酒當歸 白木 各一 酒芍 酒芍 川芎

合類八月卷之六

西藥房

十七

防風 各五分
酒天麻 各五分
蒼木 各五分
蒼耳 各五分
酒甘草 各五分
黃柏 各四分
防風 三分
水煎 且四五服 服後蘊雜片時

大頭腫

大頭腫痛又名雷頭風時行毒濕在高巔之上故頭面痛腫疔瘡甚則咽嗑堵塞害人最速冬溫後多病此症似傷寒寒熱身痛治分表裏三陽屬連兩目鼻面腫者陽明也發耳前後并頭角者少陽也腦後項下腫起者太陽也脈浮表症多者清震湯或敗毒散加前防脈沉裏症見者宜羌活黃芩俱酒炒太黃酒蒸為主陽明加乾葛升麻芍藥石羔少陽加瓜蒌仁牛蒡子太陽加前芥防風水煎時時呷之取大便邪氣去則止甚者加芒硝或防風通聖散見傷寒方加牛蒡子玄參俱用酒炒微微下之咽喉腫痛者用姜蠶一兩太黃二兩蜜丸如彈井水化服凶荒勞役宜普濟消毒飲以安裏虛者加參歸便秘加大黃或人中黃丸傷寒方見亦炒服後俱仰臥使藥氣上行故非便秘熱盛忌用降下之藥

表裏症罷腫不消磁鋒去血通關搗表裏俱解腫不消者殺去血外用通關散方見倍羊躑躅及藜蘆少許搗鼻嚏以泄其毒火不愈欲作膿者內服托裏消毒散體倦食少惡寒者補中益氣湯加桔梗清後腫赤不消膿清色白者六君子湯助脾胃加桔梗芩歸元氣素弱脈微者用參朮芩歸陳皮柴胡升麻甘草各等分以升舉陽氣用牛蒡子玄參連翹桔梗棧半以解熱毒腫赤便屬純陽脈微便屬純陰慎之

普濟消毒飲 參連鼠參陳甘梗玄藍幾翹升柴馬姜蠶同或加防薄芎歸耳大便硬者又加黃前湯調末隨人使

普濟消毒飲 治天行大頭病頭面腫盛目不能開上氣喘急咽喉不利舌乾口燥此邪熱客於心肺上攻頭目互相傳染害人甚速 黃芩 黃連 各五分 鼠粘子 馬勃 藍板根 連翹 各一錢 人參 三錢 陳皮 生甘草 桔梗 玄參 柴胡 各二升 麻 姜蠶 各五分 為末白湯調時時服之留一半蜜丸含化或加防風薄荷川芎當歸水煎服或大便硬加酒大黃一二錢以利為度

清震湯治雷頭風升麻蒼木一兩元蓮葉一荷煎水服腫痛寒熱立收功

○清震湯 治雷頭風頭面疔瘡腫痛增寒發熱四肢拘急症似傷寒蓋雷屬震震仰盂故藥內加青荷葉謂象其震之形狀也宜此主之 升麻 蒼木各一連葉一荷 每服五錢水煎食後徐徐温服

鬢疽

鬢疽肝膽之怒火或因風熱藥同裹怒火風熱俱宜柴胡清肝

湯腫痛甚者活命飲二方見

腎虛血燥日晡潮腎水不能生木以致肝膽火盛血燥鬢及頭目腫痛者四物湯方見加玄參柴胡桔梗甘草風熱連頭面咽牙痛者犀角升麻湯方見血虛者四物湯加參芪

汗多喘渴脾勞過因勞役腫痛寒熱喘渴自汗者補中益氣湯方見去升柴加五味麥門冬炮姜

耳瘡

附侵滿月蝕瘡

耳瘡三焦肝風熱耳瘡發熱揪痛屬三焦厥陰風熱者此胡清

肝湯梔子清肝湯二方見中氣素虛者補中益氣湯方見加酒炒山梔黃芩牛蒡子寒熱作痛屬肝風熱者小柴胡湯方見傷寒加山梔川芎

痒痛出膿兼養血內熱痒痛出膿寒熱兩數牽引胸脇脹痛屬肝火血虛者八味逍遙散方見

出水貪冷屬腎虛火動切忌風藥劫耳內痒痛出水喜冷銀簪探入屬腎經虛火按怒忌用風藥燥筋宜腎氣丸諸方見

○耳邊浸淫瘡出黃水者用殺羊鬢荆芥桑肉等分燒灰入膩粉為末麻油調搽

○月蝕瘡生耳鼻面間及下可諸竅隨月盛衰用胡粉炒黃枯礬黃丹黃連輕粉各二錢胭脂燒灰一錢麝少許為末先用鹽水洗淨粉之或麻油調搽

內痔瘡

內痔瘡生於口上脰治以鈎力并鐵烙敷以雄粉支其牙最是
虛勞元氣薄初發如蓮花根蒂小而下垂乃大治法以鈎力決
其根燒鐵烙以止其血天以雄黃輕粉粉霜白芷白歛為末
敷之以槐枝作枕支其牙頰間母使口合一兩時許瘡痂定
合口自便次日出膿以生肌散敷之上脰多瘡疽見後

疥腮

疥腮發風熱犯其胃表分寒熱裏不利外因風熱腫痛在表
寒熱若升麻胃風湯方見在裏二便不利者四順清涼飲方見
積熱如表裏俱解腫痛又不消欲作膿也托裏消毒散方見
治同大頭腫

積熱腫痛頗難當膏梁厚味胃經積熱腮腫作痛或發寒熱者
用升麻黃連連翹牛蒡子白芷等分水煎服連耳上太陽部
分腫屬風熱加羌活防風連耳下小陽部分腫屬怒火加柴

胡山拖牡丹皮連耳後以陰部分腫屬相火加知母黃柏頭
面齒牙俱腫內熱口乾者犀角升麻湯方見齒牙唇口俱腫
出血者清胃散方見加石膏

內寒不潰宜補劑內傷生於涼藥不能消潰食少體倦者補中
益氣湯方見內傷氣血俱虛者八物湯方見加麥門冬五味
子傷七情有寒熱者八味逍遙散方見傷色慾連頤及耳後
腫者腎氣丸八味丸十全大補湯方見不可誤用風藥尅
伐之劑

瘰癧

瘰癧馬刀屬少陽風熱痰氣結核囊生頸前項側結核如大豆
如銀杏曰瘰癧生胸脇腋下堅硬如石形如馬力虫曰馬力
多氣少血之病總皆手足少陽相火所主蓋耳前後與缺盆
肩上下屬足少陽部分延及頰項頰車與頸屬足陽明部
分延及胸中中府雲門肺經部分者死風癰尖而小熱癰嫩
腫赤色又名血癰痰癰推助消軟瘰癧圓而動又有鼠殘癰

大小不一

實者化痰通經脈清肝養血是上方無痰不成核諸瘰初起實

者皆以化痰為主通用二陳湯痰飲見加防風桔梗黃芩竹瀝

胸緊者以此探吐尤妙○通經脈必用莢貓踈疹水使以瀉

心火古方必効散立應散是也但此二藥甚峻服後宜量體

調治體實風熱成者繼以宣熱丹服之體虛者托裏益氣湯

方見或八物湯諸方見合二陳湯多服瘡口自斂又有虛甚者

宜先服健脾藥而後服二散輕者只用莢雞丸便堅胃盛者

白蠶丸或追膿化毒散癰疽見軟硬皂子丸少陽分者柴胡通

經湯陽明分者升麻調經湯少陽陽明二經二湯合服調之

誤下則犯經禁病禁○清肝者膽與肝合病則筋累累如貫

珠寒熱熾痛乃肝氣動而為病也當清肝火為主佐以養血

若寒熱止而瘡不愈者乃肝血燥而為病也當養血為主佐

以清肝清肝益榮湯梔子清肝湯柴胡清肝湯三方俱選用

虛火滋潤肺脾腎瘡如豆粒附筋肉色不變內熱口乾精神倦

怠久不消潰及肝脈弦緊腎脈洪數乃腎水不能生木以致

肝血火動筋變忌用風藥燥肝經久爛破膿血大泄者脾腎

愈虧火炎於肺皆宜腎氣丸諸方見補中勝毒餅為王兼服逍

遙散方見婦加桔梗麥門冬玄參以清肺火多怒有肝火者

清肝解鬱湯癰疽見有寒熱者單夏枯草散肝火旺甚或近骨

處生虫作痒者蘆薈丸方見小通用貓頭丸海藻散堅丸外

治銀右散蠶繭散貓蝠散虛弱者單夏枯草膏內服外貼加

麻油

成瘻瀉水補且防瘻即漏也經年成漏者與痔漏之漏相同但

在頸則曰瘰漏在痔則曰痔漏治法則一初起者宜溫散風

冷及行腎經濕熱邪水久則大補氣血兼用薰洗平肌塞竅

之藥古方白蛇散治瘰癧成漏以其有牽牛能利腎經惡水

免至淋漓穿穴但利後當量體調治痛節酒色財氣九漏治

詳漏條

女人經閉有潮死經調及經閉無潮者可治經閉有潮或咳者

死古方用王燭散方見婦治瘰癧和血通經服之自消日進

一服七八日見効便不閉者柴胡通經湯升麻調經湯久虛

者加味道遙散方見婦人經候清肝益榮湯方見或用二陳湯方見
合四物湯方見諸方見加牡蠣柴胡黃芩女參神麩為末以桑椹膏
搗丸菘豆大每五十丸溫酒下或腎氣丸尤妙諸方見

男子朝咳是真傷瘰癧傷症之標也故瘰癧類有曰腹中有塊
頸上有核最為難治况成潰漏而不消金降火滋腎健脾胃
人又不消心淡口則潮汗咳瀉惡症蜂起其可生乎但視其
目內赤脈貫瞳人有幾條則知其幾年死面色既白金尅木
脈洪大為元氣虛敗俱為不治故曰實者可治虛者可慮

瘰癧未破宜內消調經通經散堅軟硬而必効立應瑛鷄其翳乎

○升麻調經湯

治瘰癧透頸或至頰重屬足陽明瘡深遠隱

曲肉底屬足少陰乃戊胃傳於癸腎俱作塊堅硬大小不一
益皆治之升麻八分葛根 草龍膽 黃連 桔梗
連翹 酒芍 酒柏 莪朮 三稜 甘草各五分歸尾
芍藥各三分生黃芩四分稍虛加夏枯草有痰加天花粉知
母各五分少陽加柴胡四分先用水浸半日煎熱服再用大
料為末蜜丸菘豆大每百丸服藥時足高去枕仰臥緩緩以

前湯送下

○柴胡通經湯

治少陽部分項側有核堅而不潰名曰馬刀

湯元氣無虧者可服

柴胡 連翹 歸尾 甘草 黃芩 黍粘子 三稜

桔梗各二分黃連五分紅花少許水煎熱服忌苦寒泄太便

○海藻散堅丸

治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱不食兼治一切

瘰氣神効 海藻 昆布 龍膽草 蛤粉 通草 貝母

枯礬 真松蘿各三錢麥麩四錢半夏二錢為末酒調服

或蜜丸菘豆大每卅丸臨臥葱白煎湯下并含化蠶之忌甘

○草魚雞猪肉五辛生丸

軟硬皂子丸 皂子一盞去粗皮黃心玄參連翹各一兩水

五盞煮乾揀軟者食後細嚼津液下硬者蜜丸如彈每夜含
化一丸半月即効未破者破已破者令核易落不問遠年近
且腫硬疼痛皆宜如體盛硬甚者皂子用礪砂醋煮令酥瘰
必効散 治暴患瘰癧宜此切之

三
二

○ 礪砂半錢 輕粉一錢 麝香五分 巴豆五箇 檳榔一箇
 瘰癧四十枚 為末用鷄子二箇取清調勻復入殼內濕紙
 封固蒸熟取出酒為末虛者五分實者一錢 五更姜酒調服
 如小腹作痛溺如粉片血子是毒出也 若覺小便澀痛用益
 元散一服或毒從大便出尤快 未下三日後再進一服以病
 根去盡為度

○ 立應散 連翹 赤芍 川芎 當歸 甘草 滑石各五錢

黃芩 瘰癧各三錢 土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾 白牽牛各二錢半
 川烏尖七箇 為末每一錢濃煎木通湯調臨臥服毒從

小便出如粉片血塊是也未効再服繼以宣執丹解其風熱
 且瘰癧性毒濟以烏尖或衝上麻悶者嚼葱白茶清下以解
 之如小便澀用燈心煎湯調五苓散患處用好膏藥貼若宜
 導癰疽惡毒去黃芩

○ 瘰癧丸 治瘰癧多年不瘥 瘰癧一兩 薄荷四兩

為末以鷄子清和丸兼豆太空心及半空心臨臥茶清下一
 丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每日加

一丸加至五丸後每日仍服五丸以臍下痛小便取下惡物
 為効如小便秘喫葱茶少許或用烏鷄子一箇頂上開一竅
 攪勻以瘰癧一箇入內以紙封之蒸熟去瘰癧吃彈一日一
 箇煎生料五積散送下不過四五枚已破者生肌未破者消散

瘰癧已破兼外治曰蛇白蠶宜執神中而銀右蠶鹽爾貓蝠可敷也

○ 白蛇散 治九漏瘰癧增寒發熱或痛或不痛

白花蛇二兩 青皮二錢 黑丑各五錢 生犀角五分
 為末每一錢入膩粉五分研勻五更糯米飲調下已時利下
 惡物十日後再進一服已發風癰熱物如瘰癧已成者一月可
 効利後用海藻石決明羌活瞿麥各等分為末米飲調下二
 錢日三服下盡清水後調補以除病根

○ 白蠶丸 治瘰癧生於頭項上交接名蛇盤瘰癧宜早治之

海藻 姜蠶 各等分為末取白梅肉湯泡搗丸梧子大
 每六七十丸臨臥米飲下毒當從大便泄去忌豆心鷄羊酒
 麩豆五六服或單用海藻一斤浸酒服亦好

○ 宣執丹 解瘰癧風熱之毒自小便宜毒後及病雖愈宜常

服之 薄荷 皂角 連翹 何首烏 蔓荊子 三稜
前芥各一兩 為末用熱醋浸發豆豉二兩半搗膏和丸梧
子大每三十九丸熱水下日一服

○補中勝毒餅 治瘰癧馬刀挾癭在手足少陽陽明部分受
心脾之邪而作 黃芪 一錢 人參 三分 甘草 五分已上三味

當歸 生地 熟地 白芍 各三分已上四味和血生血
陳皮 三分 升麻 五分足陽 柴胡 五分足少陽

連翹 一錢散血結氣聚 防風 五分散風去 已上共為末
湯浸蒸餅調劑捏作餅子晒乾搗如米粒大每三錢白湯下

如足陽明部瘡多倍升麻加漏蘆一錢乾葛五分手足太陽
項脊背腰强者加羌活一錢獨活五分腫甚加鼠粘子三分

堅硬加昆布硬甚加三稜莪木各二分寒月身涼或有腹痛
加肉桂二分暑月身熱或有煩悶加酒黃連黃柏各三分腸

胃有瘀血加牡丹皮三分少食加麥芽神麩各二分便秘加
酒大黃或麻仁桃仁秦艽陰寒秘結去諸苦藥加附子一錢

姜煎冷服如瘡屬陽明部分忌柴胡鼠粘子屬少陽部分為

馬刀挾癭已獨活漏蘆升麻乾葛加瞿麥三分

○銀右散 硃砂 雄黃 蛇含石 磁石各一錢 銀右石各一錢
乳香 沒藥各一錢 明礬 一錢 信石 白丁香各六分

麝香 三分 牛黃 一分 巴豆半錢 為末唾口涎調勻用本
身男左女右手塗瘡上外用新筆蘸藥圈四圍藥點中間水

粉膏方見外科通用 貼之上藥丁七二七其核自落後用生肌散
○蠶繭散 蠶繭 三箇 白礬 信石各一錢 俱火煨為末搗爛

肉上二三日其核即下

○瘡蝠散 治瘰癧多年不愈神效
瘡蝠 一箇 二味俱搗黑豆上同燒其骨化
碎為末乾檢

○通用瘡頭要戒加

○瘡頭丸 治瘰癧馬刀不問遠年近日已破未破用此加戒
得宜皆效 瘡頭骨 一箇 瘡蝠 一箇以硃砂二錢填 南星

白礬 一錢 為末用黃蠟溶化和丸菜豆大每廿丸臨臥
米飲下如風熱實者加防風黃芩山梔蟬退川芎連翹桔梗

各五錢虛者加夏枯草二兩麻務骨蒸加玄參二兩胡黃連
五錢汗多加牡蠣三錢有咳加麥門冬二兩血虛加歸芍生
地氣虛加參朮各一兩毒重加雄黃痛甚加乳沒各二錢堅
硬加海藻四錢成漏加穿山甲一兩便燥用蜜為丸空心及
夜卧含化三丸尤妙

吞貼夏枯益虛者

○單夏枯草散膏 治瘰癧馬刀已潰未潰或日久成漏生血
散結退寒熱之聖藥也 夏枯草六兩水二鍾煎至七分食
遠服虛甚者煎成膏多服益善并塗患處兼服十全大補湯
加香附貝母遠志惟實者宜以行散之藥佐之

○治瘰癧潰爛久不愈者 用鼠骨亂髮如鷄子大以三年臘
月猪脂煎令骨髮俱消半塗瘡平酒調服須臾鼠子從瘡口出

痰核

痰核在頸全不痛頸項生核不紅不痛不作膿推之則動乃痰
聚不散也不可誤用瘰癧藥治宜二陳湯方見痰飲加大黃連翹

柴胡桔梗體薄者二陳湯加桔梗黃芩玄參麥門冬及防風
少許入竹瀝多服自消如耳後與項間各有一塊者含化丹
在臂或痛亦不紅臂核或作微痛者以內無膿故外雖腫不紅
或生背膊皆然宜陳皮半夏茯苓防風酒各一錢連翹二
錢皂角刺一錢半川芎蒼朮各五分甘草三分水煎服

遍身結塊多痰注濕痰下體却宜通凡遍身有塊多是痰注但
在上體多兼風熱在下體多兼濕熱宜加味小胃丹竹瀝連
痰丸二方量體虛實服之通用海帶丸

痰核潤便含化丹或海帶丸以內消融

○含化丹 治腦項耳後結核

姜蠶 大黃 青黛 膽星 各等分為末蜜丸含化

○海帶丸 治痰核瘰癧氣經久不消

海帶 青皮 貝母 陳皮 各等分甚者加昆布為末
蜜丸彈子大每一丸食後含化

瘰癧

合類入月卷上

瘰癧有五應五應舊分五瘰六瘰惟薛立齋止言五瘰蓋瘰癧本共一種皆痰氣結成惟形有大小及生頸項遍身之殊耳立齋云肝統筋怒動肝火血燥筋攣曰筋瘰心主血勞役火動陰火沸騰外邪所搏而為腫曰血瘰脾主肉鬱結傷脾肌肉消薄外邪搏而為腫曰肉瘰肺主氣勞動元氣腠理不密外邪搏而為腫曰氣瘰腎主骨勞傷腎水不能榮骨而為腫曰骨瘰瘰之名有五者此也仁齋云筋脉呈露曰筋瘰赤脉交絡曰血瘰皮色不變曰肉瘰隨憂愁消長曰氣瘰堅硬不可移曰石瘰瘰之名有五者此也瘰癧俱內應五臟藥治相同瘰走遍身瘰頸項瘰瘰所以兩名者以瘰形似櫻桃一邊縱大亦似之槌槌而垂皮寬不急原因憂患所生故又曰瘰氣今之所謂影囊者是也瘰初起如梅李皮嫩而光漸如石榴瓜瓠之狀原因七情勞欲復被外邪生痰聚痰隨氣留在故又曰瘰癧總皆氣血凝滯結成惟憂患耗傷心肺故瘰多着頸項及肩勞慾邪氣乘經之虛而在故瘰隨處着之雖無痛痒有虛實散堅行氣不可妄瘰瘰或軟或硬無痛無痒

瘰癧

體實者海藻散堅丸方見瘰癧海帶丸方見瘰癧痰核痰火盛者舐掌散神效開結散此皆化痰行氣破堅之劑久虛者不可妄服虛者筋瘰腎氣丸或八物湯二方見瘰癧加山梔木瓜炒黑龍膽草肝火盛者間以蘆薈丸方見瘰癧暫服血瘰四物湯方見瘰癧加茯苓遠志肉瘰歸脾湯方見瘰癧補中益氣湯方見瘰癧氣瘰補中益氣湯骨瘰腎氣丸補中益氣湯方見瘰癧○通用初起者十六味流氣飲方見瘰癧瘰癧單蜘蛛方稍久者蠟礬丸方見瘰癧常服自然縮小消磨外敷南星膏切不可輕用針刀決破破則膿血崩潰參漏無已必至殺人但有一種脂瘰紅粉色全是痰結用利刀破去脂粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點其蒂俟茄落即用生肌斂口藥敷之防其出血

瘰癧開結舐掌散或南星膏以外敷為

神效開結散 治男婦項下瘰癧不問遠年近日皆效

沈香 二錢 木香 三錢 陳皮 四兩 珍珠 九粒 砂鍋 固濟 火煨 豬酥肉子 生豬頂下喉嚨系一放 茄棗 大微 扁色紅取 四十 九箇 尾上焙乾 共為末 每二錢 以時冷酒調徐徐嚥下 輕者

三五服見效。一料全愈。酸鹹油膩滯氣之物。

○砥掌散 海藻散一兩黃柏二兩為末每用少許置掌中待時舐之津液送下如消三分之二即止後服。

○單方 瘰癧氣瘰癧皆效 大蜘蛛搗酒頭服或海藻浸酒久服

○南星膏 治肌膚頭面頸項生瘰癧大如拳小如栗或軟或硬或不疼不痛癰疽亦治

鮮南星一箇細研稠粘滴好醋三五點和膏或醋調乾南星未亦好先將針刺腫處令氣透却以前膏攤紙上量形大小貼之覺痒則頻貼取效執者加黃柏顯者加川烏尖少許

手部

疔

疔屬肝膽小腸經多患於手背及指間或如黃豆大或如聚粟或如熟椹拔之則絲長三四寸許又曰手背發風熱怒火或亡精風熱血燥筋縮者八味道遙散加黃連或清

肝益榮湯怒火者柴胡清肝湯三方見亡精腎枯筋縮者腎氣丸方見

切忌寒涼藥與灸誤犯出血必傷生誤用寒涼降火之藥及螻螂蝨絲纏花紫線繫着艾炙等法輕者反劇重者大潰脾痛發熱出血而死慎之

甲疽 代指 天蛇頭 鴛掌風

甲疽惡代雖害事不似鴛掌風難平甲疽乃毒氣攻於手足指

發肉果上指甲疼痛出血瘡中有虫或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛俱用綠礬五兩置鉄板上以炭火封之吹令火熾其礬即溶流出赤汁者是真俟流汁盡去火待冷取為末色似黃丹收之先以塩湯洗拭後用綠礬為君入乳香少許敷之重者用綠礬五錢蘆薈一錢半麝香一字為末以

絹袋成囊納所患指於袋中線札定以瘻為度代指掉頭先腫嫩執製痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫先用芒硝煎洗然後用烏梅核中仁為末醋調成

膏入指潰之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之

○天蛇頭瘡生手指上或足瘡傍下塊開口腫痛用鷄母楊根
 煨醋浸一宿即消或以雄黃入鷄子內以患指浸其中一宿
 次早更以蜈蚣燒烟薰病指一二次即消如痛甚流血不止
 者用雄黃蜈蚣全蝎為末擦在瘡上却以少油抹帛上扎之
 ○鷺掌風癰用猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定煨爛
 食之次日用白蘚皮皂角雄黃各五分鉛製水銀二分為末
 臨夜用鷺脂姜汁調搽次早以泔擦去然後量體服去風之
 藥此癰乃楊梅瘡類如多年不愈者先用磁鋒磨刮次以草
 麻子一兩枯礬二錢為末桐油調搽火烘極乾再以棗肉三
 兩水銀五錢枯礬三錢搗爛如泥每日擦手十餘次次以肥
 皂酒糟洗淨十次神效更灸勞宮或內關一穴斷根
 ○又方桐油調密陀墮末搽掌外用水龍骨火燒烟薰之治手
 足掌風及懸花癰更以樟葉煎湯洗之

紅絲瘡

紅絲瘡最害入速或生於手或生於足發癩初黃變紫青絲迤入
 心毒入腹紅絲瘡因喜怒不常血氣逆行而生於手足間有黃
 泡其中忽紫黑色即有一條紅絲迤進血上而生若至心腹
 則使人昏亂不救或有生兩三條紅絲者急以針橫截紅絲
 所到之處刺之令其出血以膏藥貼或薺草草根敷之立愈

胸腹部

乳核 乳癰

乳房膽胃乳頭肝婦人之乳男子之乳皆性命根也病初嘔渴增熱寒煩渴嘔
 吐者膽胃風熱也甚則毒氣上衝咽喉妨礙寒熱若肝邪也
 此皆表症宜不換金正氣散加天花粉能止渴嘔定寒熱咽
 隔有碍者甘桔湯二方見傷寒加生薑或護心散方見癰疽如潰後見
 此四症為虛

婦人胃厚多憂鬱火化汁濁塞竅端結核有兒吹熱氣飲食厚
 味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房汁化為濁膿肝經氣滯乳

頭竅塞不通，結核不散，痛不可忍，初起便宜隔蒜灸法。

見外科 切忌針刀，能飲者一醉膏加芎歸各一分，一服兩服。

即効，不能飲者，瓜蒌散。○結核亦有氣血虛弱，略被外感，內

傷，以致痰瘀凝滯，俱以古芷貝散為王，血虛合四物湯。

更加參朮柴胡升麻氣虛合四君子湯，方見更加芎歸柴胡

升麻憂思傷脾者，歸脾湯，方見加瓜蒌根貝母白芷連翹其

草節水酒各半煎服，有肝火結核腫痛甚者，清肝解鬱湯，方

癰疽。○吹乳因乳子膈有痰滯，口氣熾熱，含乳而睡，風熱吹

入乳房凝住不散，作痛初起須忍痛，揉令稍軟，吸令汁透，自

可消散，不散宜益元散冷姜湯，或井水調，一日一夜服三五

十次自解，重者解毒湯，二方俱頓服之，挾氣者古芷貝散，單

青皮湯，外用漏蘆為末，水調敷，又有乳汁不行，妨乳脹痛者，

湧泉散，方見婦人產後。

核久成癰，硬腫漫，核久內脹作痛，外腫堅硬，手不可近，謂之乳

癰，未潰者仍服瓜蒌散，內托升麻湯，方見癰疽，或復元通聖散，方

癰痛，加熟蘆虛者，托裏消毒散，將潰兩乳間出黑頭瘡，頂下

作黑眼者，內托升麻湯已潰寒熱者，內托十宣散，已上三方

少食口乾者，補中益氣湯，方見癰疽，內熱者八物湯，方見加

五味子，胃虛嘔者，六君子湯，方見加香附砂仁，胃寒嘔吐或

瀉者，六君子湯加乾姜藿香，遇發腫痛者，八物湯倍參芪歸

木，遇怒腫痛者，八物湯加山梔。

又有核小，全不痛，久則潰漏，癢益難醫，怒有傷肝脾，結核如鱉

者，子大，不痛不痒，五七年後外腫紫黑，內漸潰爛，名曰乳癰，

滴盡氣血，方死，急用十六味流氣飲，方見癰疽，及單青皮湯兼服，

虛者只用清肝解鬱湯，方見癰疽，或十全大補湯，方見癰疽，更加清心

靜養，庶可苟延歲月，經年以後必於乳下潰，一穴出膿，及中

年無夫婦人死尤速，故曰夫者妻之天，惟初起不分屬，何經

絡急用葱白寸許生半夏一枚搗爛為丸，茶實大以絲裹之，

如患左塞右鼻，患右塞左鼻，二宿而消。

男兒乳疾何須怪，怒慾損傷精血乾，男子乳疾治與婦人微異，

者女損肝胃，男損肝腎，蓋怒火房慾過度，以致肝虛血燥，腎

虛精怯，不得一行，痰瘀凝滯，亦能結核，婦人胎產後亦有肝

癰。

虛者犬藥男二兩乳腫者瓜蒞散十六味流氣飲方見左乳若足三陰虛鬱怒所致八物湯方見諸虛加山桅牡丹皮或清肝解鬱湯方見癰疽火盛風熱者更加炒黑草龍膽五分腎虛者腎氣丸方見諸虛食少作嘔胸脇作痛日晡頭疼溺澀者六君子湯方見諸虛加芩歸柴胡山桅潰爛作痛者十全大補湯腎氣丸方見諸虛因勞怒則痛并發寒熱者補中益氣湯方見諸虛加炒黑山桅不可輕用清熱敗毒之劑

乳核一醉可消正貝中滿蘆可加

○一醉膏 治癰疽發背乳癰初起神效

瓜蒞一箇去皮研爛甘草五錢沒藥二錢用紅酒三碗煎至一

碗半分兩次溫服重者再進一服以瘥為度或加當歸白芷乳香亦妙如要宜盡加皂刺一分

○古正貝散 治有孕乳結核名內吹妳有兒外吹妳宜此頻服不然膿出 白芷 貝母 各等分為末每一錢酒調頻服若無乳行者加漏蘆煎酒調服外用起醇生麩如蜂窠發過上有青色無妨焙乾為末并水調敷如乾以水特潤之甚

若加白芷貝母乳香沒藥少許

乳癰單青頻服瓜蒞外參送難舍

○單青皮湯 治婦人久積憂鬱乳房內有核如鷲基子

青皮四錢水煎日二服一丸用陳皮去白炒為末入麝香少許每二錢酒調服初發赤腫痛不可忍一服即散已潰及外吹妳亦效

○瓜蒞散 治乳癰未潰者即散

瓜蒞仁消毒青皮一錢石羔二錢甘草節行氣沒藥止痛歸尾破血皂刺 金銀花各五青橘葉取汁二水酒各半煎空心服如已潰者去石羔沒藥皂刺金銀花用當歸身加人參黃芪川芎白芍煎服

○單方 用蒲公英金銀花等分水煎濃汁入酒少許服之即散
○治乳癰癰爛見心者 用猫兒腹下毛煨存性為末乾糝或入輕粉少許清油調搽

肺癰痿

肺癰因痿火益火益經年久咳熱極葉焦而為痿。猶草木亢甚則

枝葉痿落也。火燥甚則腐脹為膿血成癰。病因汗吐下後亡

津。或腎虛火炎。或厚味薰蒸而成。其候惡風咳嗽鼻塞流涕。

項強不能轉側。皮膚不澤。胸脇脹滿。呼吸不利。吐痰血腥穢。

癰口乾燥。痿涎粘膿。成胸痛。或悶竅。調和金水。胃脾兼肺痿。脈

數而實寒熱往來自汗。咳唾口中涎多。知母茯苓湯主之。如

咯血。將變癰者。紫苑散。火盛者。人參平肺散。為丸。含化。虛損

者。叔勞散。方見虛冷不渴者。灸甘草湯加乾姜。喘急有寒邪

者。小青龍湯。傷寒喘急面浮。鼻塞胸脹者。古葶藶散。方見

是知肺痿有寒有熱。而以清金降火豁痰為主也。○肺癰脈

數而虛。口燥咽乾。胸脇隱痛。二便赤澀。咳唾膿血腥臭。置之

水中。則沈。桔梗湯主之。如吐膿者。消膿飲。咽痛者。甘桔湯。方

傷寒便秘者。太乙膏。方見外科通用為丸。白湯下。又有胸脇間開

竅。口中所咳膿血。與竅相應而出者。宜大補氣血。血多者。梅

豆湯。方見腸癰。冷熱不調者。雲母膏。方見外科通用為丸。甘桔湯下。痰多

少食者。托裏清中湯。方見癰疽。咳喘短氣。溺少者。參芪補肺湯。脾

者生。

虛少食者。參朮補脾湯。七情饑飽勞力傷脾肺者。團參飲。子

方見咳喘痰壅者。腎虛也。腎氣丸。口乾燥者。虛火也。八味丸

二方見去附子。加五味子。有吐膿血。如肺癰。口臭諸般。藥不

効者。消風散。方見頭痛。加髮灰。米飲下。大槩面赤。當補脾腎。面白

當補脾肺。蓋補脾以生肺金。補肺以生腎水也。如陰火發熱

咳吐膿血。痰如糯米粥。脈浮大者。死。若膿血自止。脈浮短澀

者生。

桔梗湯中用防己。百合貝母瓜蒌子。甘節參歸杏仁。桑白黃

芩。佐使。

○桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴

桔梗 防己 貝母 瓜蒌仁 人參 當歸 薏苡仁

桑白皮 各四 百合 甘草節 杏仁 黃芩 各二

姜煎。溫服。如大便秘。加大黃。小便赤。加木通。

知母茯苓湯。黃芩。五味。欬冬。半夏。參朮。麥冬。柴薄。芍膠。草。夜嗽。歸

地。藥。官。增。

○知母茯苓湯 治肺癰喘嗽不已。往來寒熱自汗。

知母 茯苓 黃芩 五味子 款冬花 桔梗
麥門冬 柴胡 人參 半夏 薄荷 甘草
白朮 大川芎 阿膠 生薑煎服如夜嗽甚加當
歸地黃

人參平肺散 桑皮 君知草 地骨 五味 群青 陳半 茯苓 門冬 姜煎
為丸要搗勻

○人參平肺散 治心火射肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛
胸膈痞滿咽隘不利
桑白皮 一錢 知母 七分 甘草 地骨皮 陳皮 各五分
五味 卅粒 茯苓 青皮 人參 天門冬 各四分

姜煎溫服或為末姜汁糊丸彈子大食後嚼化如熱加黃芩
四分紫蘇半夏各五分如午後熱聲嘶加杏仁桔梗有膿血
將變癰加紫苑

消肺癰腫以商星補肺神脾真要訣

○消膿飲 治肺癰有膿腥氣上衝嘔吐咳嗽
商星 一錢 知母 貝母 生地 阿膠 川芎 桑白皮

白芩 白芷 甘草 射干 桔梗 天門冬 薄荷
杏仁 半夏 紫蘇 防風 枳殼 生薑 七片 烏梅 一箇
水煎服

○參芪補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳吐膿血發熱
作渴小便不調 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮
當歸 山茱萸 山藥 五味子 麥門冬 甘草 各五分
熟地 一錢 牡丹皮 一錢 姜煎服

○參木補脾湯 治肺癰脾氣虛弱咳吐膿涎中滿不食凡肺
癰見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治
人參 白朮 各二錢 黃芪 二錢 茯苓 陳皮 當歸 各一錢
升麻 三分 麥門冬 七分 桔梗 六分 五味子 四分 甘草 五分
姜煎服

止肺痿血用紫苑白薇白芩非苟且

○紫苑散 治虛勞咳嗽見膿血肺痿變癰
紫苑 知母 貝母 人參 桔梗 茯苓 阿膠
甘草 各五分 五味子 十粒 姜煎服

○參芪補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳吐膿血發熱
作渴小便不調 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮
當歸 山茱萸 山藥 五味子 麥門冬 甘草 各五分
熟地 一錢 牡丹皮 一錢 姜煎服

○參木補脾湯 治肺癰脾氣虛弱咳吐膿涎中滿不食凡肺
癰見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治
人參 白朮 各二錢 黃芪 二錢 茯苓 陳皮 當歸 各一錢
升麻 三分 麥門冬 七分 桔梗 六分 五味子 四分 甘草 五分
姜煎服

止肺痿血用紫苑白薇白芩非苟且

○紫苑散 治虛勞咳嗽見膿血肺痿變癰
紫苑 知母 貝母 人參 桔梗 茯苓 阿膠
甘草 各五分 五味子 十粒 姜煎服

○參芪補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳吐膿血發熱
作渴小便不調 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮
當歸 山茱萸 山藥 五味子 麥門冬 甘草 各五分
熟地 一錢 牡丹皮 一錢 姜煎服

○參木補脾湯 治肺癰脾氣虛弱咳吐膿涎中滿不食凡肺
癰見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治
人參 白朮 各二錢 黃芪 二錢 茯苓 陳皮 當歸 各一錢
升麻 三分 麥門冬 七分 桔梗 六分 五味子 四分 甘草 五分
姜煎服

○單白欬散 白欬同，槿樹皮煎湯飲之，能收斂瘡口。
○單白及散 治久嗽成痿，咯血紅痰。
白及為末，每二錢臨臥糯米飲調服。

心癰

心癰胸發名，并疽。胸乳間生，蜂窠癰發名，并疽狀如豆，大三四，
日起不早治，入於腹十日死。

外發可治，內傷疽降火清心為要藥。心熱成極急，用疎導心火
之藥，遲則不救。小便澀者，清心散或涼膈散。積熱去硝黃加
白芷、天花粉、瞿麥、木通、大便秘者，內固清心散或涼膈散去
硝，加白芷、天花粉、生地。

內固清心散癰發胸前

○內固清心散 治惡瘡熱甚，熾痛作渴，煩燥以此解毒神效。
辰砂 茯苓 人參 白豆蔻 雄黃 菴豆 朴硝
甘草 腦 麝 皂角 各等分，為末，每一錢蜜湯調服。
○清心散 治癰有熱症，遠志 赤茯苓 赤芍 生地

麥門冬 知母 甘草 各等分，姜棗煎服。如小便閉，加
燈心木通。

○清心丸 治諸痛痒瘡瘍，皆屬心火。此藥主之。
黃連 一兩 茯神 赤茯苓 各五 為末，蜜丸，梧子大，每百
丸米飲送下。

脇癰

脇癰一樣，忌補虛。初起神効瓜蒌湯或柴胡清肝湯。癰疽見蓋胸
脇，肝心火盛，虛中有熱，決不敢投陽藥。潰後方敢清熱托裏
兼滋腎水，誤投熱藥，易傷骨膜，慎之。

○脇癰用鷄房粘，搗爛入鹽少許醋和敷之，消腫止痛，膿成者
敷之即安。

神効瓜蒌湯癰生脇下

○神効瓜蒌湯 治乳癰腸癰一切癰疽，初起者消，已成者潰
及潰後餘毒，老幼皆宜。其查又可外敷。
瓜蒌 一箇 當歸 甘草 各五 沒藥 乳香 各一

水酒各半煎服

胃癰

胃癰胃熱咳膿血人迎反盛胃脈沉胃脘癰因飲食七情火鬱復被外感寒氣所隔使執瀉之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脈沉細惟寒氣所隔故人迎緊盛有此二脈者胃癰真也

寒熱如瘡皮毛縱先宜疎利次補升外症寒熱如瘡胃濁則肺金失養故身皮錯縱或咳或嘔或唾膿血俱大射干湯主之

胃火盛者清胃散方見血症痰壅者甘桔湯方見傷寒大便不利者太乙膏方見外科為凡服小使不利者三仁湯內痛者失笑散方見心痛虛而痛者牡丹散膿出食少者補中益氣湯方見內傷升提胃氣或佐以前藥調之不可專治其瘡

太射干能升胃三仁牡丹清芳

○大射干湯 治胃脘癰熱成癰腐爛成膿身皮甲錯咳嗽膿血

射干 山梔 赤茯苓 升麻各一錢 赤芍一錢 白朮五分

水煎入地黃汁一合蜜少許調服如熱毒盛加磨犀角汁以

助林麻咽痛便秘加馬牙硝馬勃

○三仁湯 治腸癰腸中疔痛煩毒不安或脹滿不食溺澀婦

人產後屢熱多有此病縱非是癰症疑似之間便可服之

薏苡仁二錢 冬瓜仁二錢 杏仁 牡丹皮各一錢 水煎溫服

○牡丹散 治腸癰冷症腹滿而痛時時下膿或血

牡丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪 薏苡仁

栝仁 白芷 當歸 小麥各一錢 官桂 甘草各五

木香三分 水煎服

腸癰

腸癰小腹痛若淋濕熱痰痲注內膜甚者腹脹有水聲便膿臍瘡皆敗惡瀉熱鬱積成癰痰火盛者脈數而滑挾瘀血多有脈數而乳外症小腹腫強按之則痛小便若淋儼似奔豚發熱惡寒脈遲緊者未有膿也太黃湯或五香連翹湯方見癰疽下之不敢下者敗毒散方見傷寒加秦九連翹脈乳瀉者四物湯方見諸虛加桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者已有膿也三仁湯方見胃癰

神効瓜蒌湯腸癰見小腹痛小便利者膿壅滯也牡丹散
方見若腹脹大轉側聞有水聲或逆臍生瘡出膿太便屢下
膿血者不治

間有虛冷皮甲錯腹皮似腫按軟弱中無積聚外無潮脈數還
宜用溫藥脈數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急如腫按之
却軟乃內虛陰冷凝痰成癰牡丹散方見或內托十宣散方見
癰疽加茯苓甚者敗醬散以小便利為驗

又有冷熱相交併消痲和中後補托腸癰冷熱症用雲母膏方見

外科為丸牛膠煎酒下利去瘀膿則愈其間有痛甚大便從

小便出者亦宜如下膿過多者梅豆湯合甘桔湯方見和之

蠟礬丸方見尤妙膿上後內托十宣散方見或八物湯方見

諸虛補中益氣湯方見以固本元愈後却宜靜養若動作躁

暴或被驚恐則腸斷而死凡癰生小腸分尤可太腸分近肛

門者難治肛門破者即死

○大黃湯本利腸敗醬梅豆多寡治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或微赤腫

小便如淋汗出憎寒其脈遲緊膿未成者宜急服之

大黃 朴硝各一 牡丹皮 瓜蒌仁 棗仁各二 水煎服

○敗醬散 治腸癰脈數身無熱腹濡冷症

薏苡仁半二錢 敗醬一錢 附子五分 水煎空心溫服以小

便利為度

○梅豆湯 治腸癰冷熱症及肺癰咳唾膿血不止

烏梅 一箇 黑豆 百粒 薏苡仁 二合 水煎入阿膠生蒲黃

腹癰

腹癰腹痛關脈數飲食七情火滯者腹癰生於肚腹皮裏膜外

左關脈洪數而腹痛甚者是也膏梁七情火鬱以致脾虛氣

滯而成小兒多因驚積虧損而成食積疝氣相類不可誤治

無膿腫硬色如常慢腫堅硬肉色不變未有膿也四君子湯助

脾胃加芩歸白芷枳殼或托裏散若掀腫痛甚者邪氣實也

先用活命飲二方見隔蒜灸見外科以殺其毒後用托裏散

以補其氣

膿成腫軟色緒若腫起而軟色緒赤者膿成也托裏消毒散助

潰未皆宜壯胃元行經活血已涼藥不問初起已潰未潰俱宜

壯胃元氣而佐以行經活血若誤用尅伐及利下涼藥則腫

不能潰潰不能斂壯者難治老弱立死若魯經誤下及服降

火破氣消痼之藥大劑參芪姜附或十全大補湯救之

呼嗟九疽認亦難按穴方知審經絡中府屬肺巨闕屬心期門

屬肝章門屬脾中腕屬胃京門屬腎大樞屬大腸丹田屬三

焦關元屬小腸每大內隱隱痛者為疽肉上微起者為癰假

如中府隱痛者肺疽也上肉微起者肺癰也各穴做此十六

背腰部

背發 七種 腰發 二種

發背五臟毒蘊成七情六慾外邪并背雖膀胱督脈所主然五

臟所係於背或醇酒厚味或鬱怒房勞以致水枯火炎痰凝

氣滯或被外邪與毒相搏隨處發生

肩下脊上脾家毒發在肩下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一

寸雖潰在骨不穿膜不死急治脾肚中之毒內服護心散助

癰疽外用敷藥恐毒入心大要服藥截住如通脊背腫者不

可救

偏右蓮蓬子內生蓮子發生於右脾中外如蓮蓬內有子孔恐

其毒入心大要用托裏散癰疽加芬連黃柏荷蓋散之不

令攻心漸消可治通背腫者危

偏左初起汗即散脾發生於左脾間初起可用燈火點破內服

追疔湯方見汗之即散

左搭右搭肺肝情右搭肩發骨上生者以動之處可治若串左

肩難治左搭肩發骨上生者以動之處可治若串右肩難治

二症內服托裏散癰疽加升麻桔梗外用去毒散方見外或

綿絮燒灰為末糝之乾者麻油調搽

脊中蜂窠防膜透蜂窠發正當脊心形如蜂窠有孔在上者不
宜最為反症宜托裏散癰疽加菊花生肌定痛防毒攻心難
治因心火未發故也

對心火毒太相凌對心發極重因心火盛而執氣會生於此其
毒壯盛走暴急用疎導心火之藥解之

散走流注風熱盛散走流注發毒氣乘風熱而走急宜疎風定
執治之則氣自息若流注於手脚腿者必死無疑

氣食陰虛龜見形此發頭尾俱尖四邊散大如龜之形因飲食
所致而氣食相關合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而
潤急服托裏補藥

腎俞濕熱躡生發房怒兼之雙發平腎俞發因受濕并怒氣飲
熱酒傷於內腎流毒腎俞生疽急用藥解內腎之毒若腎經
見有濕熱更加房勞鬱怒過度則兩腎俞穴生發陽發於外
者可治陰發發傷腎膜及膿稀者死又有腎俞一發脾骨
上一發肩膊上又生二發亦謂之雙發

慢腫難治焮腫易焮腫發熱疼痛色赤作渴脉滑數有力先服

活命飲後用托裏消毒散二方見慢腫不熱微淡色黯作渴

脉數無力者腎虛也托裏散小食者六君子湯加姜朮

熱陰虛者四物湯加參朮腎氣丸惡寒熱四邊漸

大者陽氣虛也單人參湯傷寒十全大補湯小便頻數者八

味丸二方見初起食少者邪成脾虧也急用補中益氣湯救

乏方見傷今俗專用養命丹二方見施於因怒因飲食

毒及肥人則可若瘦人及因怒火者反燥陰作渴致泄或血

瀉毒氣不行惟初起或一服之則可凡焮腫氣血勝毒易消
慢腫服托裏不應者乃毒勝氣血死在旬日或已發出而不
腐潰者須急用托裏藥兼補脾胃不應死在二旬若已潰而
色不紅活者用托裏散劫加參朮肉桂及補脾之藥却
能生肌瘡口黯暈大而不斂乃脾崩也死在日餘

總論中間法可憑表症內托發并裏症內疎通在經和解體虛
者未潰托裏消毒已潰托裏溫補詳前總論

腎月腿部

今限八門

腎月癰

附腎疽瘡

腎癰太陽部位與雖然多血氣空到腎居小腹之後部位僻與雖曰多血然氣既穿到血亦空來中年患此誠為可慮

陰虛濕熱是病根內托固裏性無驟切起未成膿者隔蒜灸再

用葱熨法二方俱見欲作膿者內托差活湯痛甚者活命飲

腫硬痛者托裏消毒散微腫痛者托裏散已上四方脾虛不

能消散或食瓜不疔膿者六君子湯方見加苦歸黃芪偏右

腎腿若尤宜腎虛不能消散或作渴溺淋者腎氣丸方見有

脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者補中益氣湯方見

或十全大補湯諸方見潰後尤宜進此一藥以固其裏兼節酒

色戒躁暴乃可萬全

○腎疽瘡痛痒者摩風膏方見只痒甚有虫者用硫黃一兩入

言一錢為末用醋調勻慢火熬乾復熬化如火起將醋酒數

次傾地下待冷成餅用麻油磨濃候瘡痒搗破擦上三日即

愈

便毒

便癰屬足厥陰肝俗云便毒實血疳也生於腿膝小腹之間乃

厥陰肝經及衝任督三脉隧道乃精氣出入之路也

房慾強精只一端或入房忍精或思色不遂或當泄不泄敗精

凝滯為癰腫痛在膝腹之間先用五苓散利去敗精便秘加

大黃有寒執者小柴胡湯方見加山梔澤瀉後用腎氣丸方

諸虛以補精兼逐瘀血

濕熱因勞或被冷補瀉方詢便易難丙有濕熱外被寒邪相拒

敗痰不得散治宜清肝火活瘀血滲利腎經邪水體實二便

難者兩解湯八正散方見熱挾鬱怒者流氣飲子或復元通氣

散方見加天花粉白芷青木香腫痛甚者活命飲濕熱壅

滯者龍膽瀉肝湯方見體薄大便易而小便澀者小柴胡

湯方見加苦歸知柏澤瀉或神効瓜蒌湯方見加柴胡山梔

痛甚者活命飲去大黃○濕熱因勞倦氣滯者補中益氣湯

方見潰後俱宜托裏散方見八物湯加柴胡或十全大補湯

類入明

便毒

各文

二方俱久欲成漏者蠟礬丸方見外科通用

○單方用紫花地丁搗酒服最效

騎馬兩邊異名爾便毒左右兩邊俱發或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發用藥同前古方初起宜國老膏方見外科入皂角炭少許主之外用鳳尾草煎湯洗淨以明松香為末日三次乾粉自愈愈後仍戒房室行動

便毒兩解而敗瘀立消

○兩解湯 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼痛

辣桂 大黃 白芍 澤瀉 牽牛 菴仁各 乾姜五分
甘草二分 水煎溫服

路岐

路岐此小跨襠間腫痛者內服單蜘蛛方方見外科外用炒葱熨三五次法見外科後以消毒消腫藥加大黃木鱉子南星草烏敷

乏破者用生肌散此症小兒患之多因食積痰滯

懸癰

附穀道中瘡

懸癰足三陰虧損生穀道前陰囊之間初發甚痒狀如松子漸如蓮子日久如桃李加以赤腫若破則大小便從此中而出

不可救也

輕則漏瀝重即殞輕則瀝盡氣血而亡重則內潰即死

初起量與清濕熱初起濕熱壅滯作痛溺澀者活命飲去大黃

或龍膽瀉肝湯二方見外科

大補氣血猶恐晚不成膿不潰者八物湯膿已成者急錫之飲

其生肌收斂腎虛者腎氣丸血虛者四物湯諸動方見外科加參朮

氣虛者四君子湯方見外科加芎歸脾虛者補中益氣湯方見外科

成漏者十全大補湯方見外科蠟礬丸方見外科此疾首尾常服國

老膏雖患亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救

○穀道中生瘡用水中行葉細搗綿裹納下部日三次即愈

懸癰國老而元氣可掉

○國老膏 治懸癰不拘腫潰兩服即愈

粉草帶節，一兩用山澗水一碗浸三時，令透以慢火炙乾，仍投前水浸透，再炙至水乾為度，用酒三盞煎至八分，空心服，并查二百一服。

痔瘡

五痔原因食色傷經曰：因而飽食，筋脈橫解，腸癖為痔。蓋飽食則脾不能運，食積停聚，太陽脾土一虛，肺金失養，則肝木寡畏，風邪乘虛下流，輕則腸風下血，重則變為痔漏。或醉飽入房，精氣脫泄，熱毒乘虛下注，或滯極入，足過甚傷筋，及精停毒甚，則以男交男致傷膀胱與腎，肝筋脈蓋膀胱筋脈，抵腰絡腎，貫腎走肛環前後，二陰故痔乃筋脈病發，則面青痛甚，肝苦急也。○五痔：牡痔，肛邊如鼠乳，此痔肛邊一枚生瘡，陷入腸痔，結核腸內，脫肛出血，血痔，大便清血隨下，如射線，脈痔，腸口頗癩，發癩出血，且痛且痒。五痔散主之。又有氣痔，肛門腫痛，便難，強力則肛出不收，加味香蘇散酒痔，飲酒則發，乾葛湯。虫痔，侵淫濕爛，歲積月累，蝕腸穿穴，蝟皮丸，黑玉丹。

方見凡毒深者，大如鷄冠蓮花，核桃，毒淺者，小如松子，牛乳，鷄心，鼠乳，櫻桃，雖種種不同，皆三陰虛也。

濕熱風燥毒歸腸痔，非外邪乃臟內濕熱風燥四氣相合，蘊久流久，大腸而成毒，有腸頭腫塊者，濕也，肚腫後墜，濕兼熱也，出膿血水者，熱勝血也，痛極者，火熱也，痛痒者，風熱也，大便秘者，燥熱也，小便澀者，肝火濕熱也，又瘡頭向上或硬者，熱多，向下或軟者，濕多。

涼血和氣，清濕熱，潤燥，疎風，止痛，痔以涼血為主，蓋熱則傷血，血滯則氣亦不運，而大腸下墜作痛，太要以槐花，槐角，生地，涼血，芍藥，桃仁，和血，生血，枳殼，行氣，寬腸，於連，山梔，清熱，黃柏，防已，澤瀉，行濕，麻仁，太黃，潤燥，秦艽，煎芥，疎風，風邪，陷下，久者，防風，升麻，提之，氣弱者，人參，黃芪，補之，氣不順者，木香，檳榔，和之，古方，熱痔，黃連，阿膠，丸，清心丸，槐角丸，槐膽丹，濕熱，加味，連殼丸，或四物湯，合敗毒散，風濕，秦艽湯，燥痔，四順，清涼飲，下血者，芍藥丸，參花，便血，痛者，止痛丸，痔者，黑玉丹，腫硬者，脈胃丸。

外法割剔終有害刀割線剔損臟傷命藥點藥敷開毒變漏初

起只宜蒜灸見外科已成者防風煎芥槐花木鱉朴硝煎湯

熏洗滑脫加艾蛤蓮蓬洗後用古熊膽膏方見蜈蚣油塗之

內痔宜內生肌丸方見忌捺藥方見梅瘡

斷根滋補忌寒涼體實屬肺與大腸風熱者加味槐角丸加味

地黃丸三神丸斷根更易體薄屬肝脾腎三經陰精損者腎

氣丸方見補中益氣湯方見十全大補湯方見以滋化源更

宜者兼和者皆肝腎不足變出分專服寒涼瀉火

○蜈蚣油 端午取大蜈蚣一條方見發陰乾臨發剪一寸煨存

徑桐油調塗輕則不發重則次年對週日又發再剪一寸煨

塗斷根又法用生蜈蚣數條浸麻油內俟生蠶略熬化塗痔

及諸瘡癰

○五痔散 治五痔不拘內外冷熱

猪左懸蹄甲 鱉甲 蠟皮 露蜂房各五蛇退 一條

俱炒焦為末每一錢入麝小許井水調服如肚痔倍鱉甲牝

痔倍蠟皮腸痔倍猪甲血痔倍蛇退脈痔倍蜂房

痔初連翹連歸蘇葛秦羌止痛神

○連翹散 治食積痔 黃連 阿魏 山查 神麩 桃仁

連翹 槐角 犀角 各等分為末以少許置掌中時時

紙之津液嚥下如三分消一即止後服

○連歸丸 治痔漏及脫肛便血

全當歸 酒黃連各四防風 枳殼各二 為末用煎浸

黃連酒打糊丸梧子大每六七十丸米飲下忌羊魚鷄鷩煎

炒熟物

○加味連殼丸 治濕熱內甚飽食腸癖發為諸痔久而成瘻

黃連一兩 枳殼 厚朴各五當歸 四錢 木香 黃柏各三

煎芥二錢 蠟皮一箇 為末糊丸梧子大每廿丸溫水下

○加味香蘇散 治氣痔 陳皮 枳殼 川芎 槐花各五檳榔 木香 桃仁

國立公文書館 National Archives of Japan

蘇莖 香附 甘草各二分 姜棗煎服

○乾葛湯 治遇飲酒發動痔瘡腫痛流血

乾葛 枳殼 半夏 茯苓 生地 杏仁各五分 黃芩

甘草各二分 黑豆 百粒 姜三片 白梅一箇 水煎服

○秦菴湯 治痔漏成塊下垂不任

秦菴 羌活各一分 黃芪 一錢 防風 七分 升麻 麻黃

柴胡 炙甘草各五分 藜蘆 三分 細辛 紅花各四分

水煎服忌風處大小便

○止痛丸 治痔瘡痛甚便燥者宜此微利之古云積氣生於

脾臟傍大腸疼痛陣難當但令稍瀉三焦火莫慢多方立紀綱

菴活 一兩 郁李仁半兩 大黃 八錢 檳榔 木香 桂心

川芎各五分 為末蜜丸梧子大每三十丸空心白湯下

○三神丸 治無酒色但飽食久坐成痔初起經久皆効

枳殼 皂角煨 五倍子炒 各等分為末蜜丸梧子大每

二三十丸溫水下

痔以槐角柳膽地黃蠟皮釣腸効

○槐角丸 治痔漏脫肛五種腸風下血等症

槐角 一兩 地榆 黃芩 防風 當歸 枳殼各八

為末酒糊丸梧子大每三十丸空心米飲下

○加味槐角丸 治痔漏通用及腸風下血

槐角 生地各二兩 當歸 黃芪各一兩 阿膠

川芎各五錢 黃連各二錢 條芩各二錢 枳殼各二錢 秦菴各二錢

防風各二錢 連翹各二錢 地榆各二錢 枳殼各二錢 秦菴各二錢

升麻各二錢 白芷各二錢 共為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十丸漸至七八十丸溫酒下

○槐膽丹 不問遠年近日痔瘡服之如神久服髮固齒

十月上巳日揀肥實槐子用瓦盆如法固濟埋背陰牆上約

二三天深預先取黑牛膽五六箇臘月八日取前槐子裝在

膽內高懸陰乾至次年清明且取出磁器收貯每空心白湯

下二日服二粒二日二粒漸加至十五粒止以後一日減一

粒週而復始

○加味地黃丸 五痔滋陰必用之

類聚

痔瘡

四十二

熟地 黃芪 各一兩 槐花 黃栢 杜仲 白芷 各一兩

山茱萸 獨活 山藥 各八錢 牡丹皮 茯苓 澤瀉 各六錢

白附子 二錢 蜜丸 梧子 大每五十丸 空心米飲下

○蝟皮丸 治諸痔出血裏急疼痛欲成漏者

槐花 艾葉 炒黃 枳殼 地榆 當歸 川芎 黃芪

白芍 枯礬 貫衆 各五錢 蝟皮 一兩 髮灰 三錢

○猪蹄甲 十枚 皂莢 一錢 為末 蜜丸 梧子 大每五十丸 米飲下

○釣腸丸 治諸痔久漏脫肛腫痛或生瘡時有膿血及腸風

下血虛寒經久不愈

瓜蒞 蝟皮 各二錢 胡桃肉 十五兩 俱燒存性 鷄冠花 五兩 青礬 煨

白礬 煨 附子 生各一兩 白附子 天南星 枳殼 半夏

訶子 各二兩 為末 醋糊丸 梧子 大每五十丸 空心溫酒下

漏瘡

九漏須知初與久 凡癰疽久則宿膿腐肉停蓄其間穿孔必深

○風冷外侵消消穢膿流出如釘窠之有漏孔九漏肝王狼漏

胃主鼠漏大腸主蠅蝨漏脾王蜂漏肺王蚩蜂漏心王蟻蝻

漏膽王浮蛆漏腎王瘰癧漏小腸主轉筋漏因原氣血壅滯

染觸毒動含靈之毒而名其因治則一也在痔則有穿腸穿

臀穿陰者又有無痔肛門左右別生一竅流出膿血各為第

漏發在皮膚者易愈臟腑損者難治又有原有痔漏肛邊別

生一塊作膿就在痔孔出者乃食積注下也宜連翹散 痔方見

初濕熱久濕寒痔止出血始終是熱漏流膿血初是濕熱久

是濕寒初起淡紅微腫小核宜涼血清熱燥濕牽牛酒加味

槐角丸 痔方見 臟頭丸 便血方見 古枳巴丸 便血方見 連歸丸 痔方見

久則內如藕白外如黑腐淫由惡臭宜澀殺殺重溫補黑主

丹釣腸丸 痔方見 歸丸 苦參丸 便血方見 蠟礬丸 痔方見 又有初

起因風冷者久則虛而挾濕熱者

大補氣血兼灸灸黃洗平肌塞竅端于全大補湯 諸方見 補中益

氣湯 痔方見 黃芪 六一湯主之 丹溪用參木黃芪 各歸為

君佐以蝟皮蛇退牛角腮蜂房之類服之外用津唾調附子

癰疽疔毒

癰疽

四十四

末作餅如錢厚，放瘡上，漏大炷，大漏小炷，小炷令微熱，不可
令痛乾，則易新餅，再灸，如倦暫止，次日又灸，直至肉平為度。
外用雲母膏，方見外貼之，畏灸者，內生肌丸最妙，他如熏洗，
方齒髮散，蜂房散，平肌塞發，取膿取，丞諸方，粗實者，酌用，清
貴者慎之。

漏無輕利水而豚胃等歸急補虛

○牽牛酒 通行漏瘡，中惡水，自太腸出，黑牽牛末一分入

○豚胃丸 以線扎箕葉包，慢火煨熟，空心細嚼，溫酒送下，
入猪肚內，絳定煮爛，去藥食肚，如硬再服，以患處軟方止，或
回藥為丸，服亦可，痔漏皆效。

○芎歸丸 治痔下血不止 川芎 當歸 黃芪 神麩
地榆 槐花 各五 阿膠 煎芥 木賊 髮灰 各一

○為末 蜜丸 梧子 太米 飲下 五十九

○漏貴內生肌 而黃蠟 果王印充發

○內生肌丸 枯礬 鹿角 芝麻 各一 為末 蜜丸 梧子 太

溫酒下卅丸，發塞後去鹿角，加象牙一兩，黃蠟為丸，常服斷根。

○加味蠟礬丸 治新久諸漏 象牙 五錢 露蜂房 姜礬
蛇退 血竭 木香 各三 乳香 二錢 白礬 二兩

○黑玉丹 治男婦痔漏腸風疼痛，或穀道虫痒不可忍，
為末，黃蠟四兩為丸，梧子，大溫酒下二十丸。

○蝟皮 牛角腮 各八 猪蹄甲 百枚 雷丸 芝麻 各二
槐角 三兩 頭髮 敗棕 各四 苦練根 二兩 俱入罐內燒

○存性，取出入乳香一兩，麝香四錢，為末，酒糊丸，梧子，太先嚼，
胡桃一枚，溫酒下十五丸，日二服，甚者三服，忌別藥。

○薰漏瘡方 艾葉 五倍子 白膠香 苦練根 等分，如
燒香法，置長桶內，坐薰瘡處。

○洗漏瘡方 露蜂房 白芷 或大腹皮 苦參 煎湯薰洗，候水出，
盡拭乾，取向東石榴根皮，為末，乾糝以殺淫虫，小須傳藥。

○齒髮散 治漏瘡惡瘡，生肌裏欲乾者，用之。
人齒 頭髮 鷄腔腔 各等分，俱燒存性，入麝香輕粉

小許，為末，乾糝乾者，麻油調搽。

○蜂房散 治久年漏瘡或暫差復發或移於別處

露蜂房三分 穿山甲 龍骨各一分 麝香少許 為末臘月

豬脂調傅濕則乾

○取漏虫法 用活黃鱈一條擲在地上就其盤曲處以竹釘

五七枚釘穿以香油塗之覆瘡上扁布繫定良久覺瘡痛不

可忍取鱈入水中覺蠕動有如線之虫未盡再覆如是者五

六易後用乾艾煎湯入白礬三錢洗淨以黃連檳榔等分為

末敷之月餘方愈廉瘡亦宜

○蝸牛膏 蝸牛一錢 片腦 麝香各少許 搗爛取汁敷瘡上

痛止腫消

○古熊水膏 熊膽二分 水片半分 為末用白鷄膽三枚取

汁或蝸牛田螺井水可調勻入確內勿令泄氣臨臥以手指

搽瘡上

○取漏膿法 治內痔久漏取膿最妙惟牛乳外痔不用

皮硝三兩 苦參一兩 為末用布四寸長三寸闊縫一袋

入藥半袋以硃三分放藥末中間方入全藥裝滿縫袋中

頭安帶跨馬繫住

陰瘡

陰瘡三等屬腎肝濕瘡風濕瘡如癬濕陰瘡由腎虛風濕相搏

邪氣乘之癢痒成瘡侵淫汁出狀如疥癬

妬精作白腫痛痒妬精瘡因久曠房室思色動慾以致敗精流

入莖內初發如粟赤腫潰爛作白痛痒妨悶

陰蝕莖凡腫相繼陰蝕瘡因婦人子宮有敗精帶濁或月水未

淨與之交合房室後又未洗浴男子腎虛邪穢滯氣遂令陰

莖連舉凡腫痛小便如淋

甚久潰爛成下疳經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳瘡

久不愈必成楊梅毒宜服仙遺根湯預防之

寒熱煩渴宜詳辨非虛便是濕熱侵身體煩熱壯熱惡寒宜急

治之陰血虛而有熱者小柴胡湯傷寒加參朮芍歸脾痛發

熱者四物湯諸虛加柴胡山柅濕熱腫痛健裂寒熱者小柴

胡湯加龍膽草黃連青皮熱勝二便秘者八正散積熱濕熱

頭入明

甚則腫痛，湧溢及莖縮縱，痒痛或出白津者，龍膽瀉肝湯助
 癰疽如氣虛者，補中益氣湯方見內傷加龍膽草、山梔、煩渴不止
 者，甘葉黃芪湯方見外科腫潰後氣血虛而有火者，八物湯方見諸虛
 加柴胡、山梔、無火太便軟者，托裏散內托十宣散見方
 重太要此症，肝經陰虛為本，腫痛寒熱為標，宜常服腎氣丸
方見諸虛若專治肝，則誤矣

莖痒津出多，照輒莖中痒，出白津多，因脾土輒弱不能滋生金
 水，以致肝經血虛火燥，宜補中益氣湯方見內傷與清心蓮子飲
方見淋疾間服，蓋脾胃為肝腎之源，心實主之。○外治濕陰瘡，柏
 蛤散、銅綠散、妬精瘡、津調散、蘆腦散、陰蝕瘡、鳳衣散、下疳瘡、
 早螺散、玉莖破裂、腫痛者，鷲管散、爛臭或癢者，截疳散，或用
 洗藥、腎莖上生瘡久不愈，用經布燒灰，蜜調塗上即愈。
 有陰毛間生虫，作痒者，搗桃仁泥塗之。

陰瘡、柏蛤銅綠妬精蘆腦以津調

○柏蛤散 治下疳濕瘡 黃柏以磁鋒割末，同蛤粉末等分
 糝上即愈。蓋黃柏去熱，蛤粉燥濕，故也。

○銅綠散 治男婦陰部濕瘡

五倍子五錢 白礬一錢 乳香五分 輕粉一字 銅綠少許
 為末洗淨糝之

○蘆腦散 治下疳瘡

蘆甘石一兩 黃連八錢 同入砂鍋煮一宿，去黃連，取甘
 石、明礬、入片腦五分為末，乾糝或湯泡少許，洗一切眼疾。

○津調散 治妬精瘡、臭爛、膿汁淋漓 黃連 款冬花
 等分為末，先以地骨皮、蛇床子煎湯洗拭，然後以津液調敷。

陰蝕、鳳衣、早螺、截疳、鷲管、兼敷俟

○鳳衣散 治下疳瘡、腫痛、神效 鳳凰衣 煨黃連各等 輕粉
 片腦各少 為末，乾糝或鴨子清調。

○早螺散 白田螺殼煨過，入腦麝輕粉各少許，為末，香油調
 搽下疳瘡，上即愈。

○截疳散 治年深疳瘡，大效
 密陀僧 白礬 白芨 黃丹各一錢 黃連五分 輕粉一分
 腦 麝各半 為末，乾糝或糝入瘡口，以膏貼之。

○鷓鴣散 治病瘥後犯房主莖皮破腫痛

黃連 大黃各一分 鷓鴣石 赤石脂各五分 雄黃一分

片腦半分 為末津液調敷

○洗下疳瘡藥 黃連 黃柏 當歸 白芷 獨活 防風

朴硝 荊芥 各等分 水煎入銅錢五十文烏梅五箇搗

一匙煎溫湯日洗五七次洗後用木香檳榔黃連銅青輕粉

枯礬蝶硝各等分麝香以託為末至夜敷上

陰囊癰

附小兒陰囊生瘡

陰囊癰屬肝腎經都緣陰虛濕熱并丹溪云但以濕熱入肝施

治而佐以補陰雖潰脫可愈

溺溢清肝利濕毒初起腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴當清肝

大分消濕熱以泄宜黑龍湯吞滋腎丸方見大門如全因入房囊

腫大如斗許小腹脹悶溺溢發熱口乾痰壅命在反掌宜腎

氣丸料方見諸虛加車前子牛膝煎吞滋腎丸方見大門滲利濕熱後仍腫

痛者宜補陰托裏以速其膿而針之若膿出而便秘者熱毒

壅滯也宜托裏消毒散或不減者熱毒未絕也宜清肝益

榮湯膿已成者活命飲三方俱見難疽

潰後托裏補陰精膿潰皮脫舉丸懸掛或內見筋一條不消陰

囊悉腐王莖下面貼囊者亦腐如半邊筆管口宜托裏散方

難疽加故紙黃芪五味子兒絲子或四物湯加參朮吞腎氣

丸二方見諸虛兼服補中益氣湯方見內傷倍參芪歸朮大補氣血脾

胃切忌寒涼攻伐及淡滲損陰之藥外塗白蠟膏方見外科

莖旬日可復雖曾去陰子亦無害又有因水腫囊腫潰者見

內科○陰囊兩傍生瘡濕痒甚者牡礬丹或連兩腿生風

濕瘡者硫磺散

○小兒陰囊生瘡及陰股間汁出先痒後痛愈後復發先以火

灸瘡去痴令乾以蜜敷之却搜髮作餅炙熱乘熱熨之令

則再灸再熨以愈為度

止囊痒牡礬檳硫頻擦

○牡礬丹 治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出其痒甚苦夜則搔

之無足後必自痛又兩腋及脚心汗濕無可奈何者亦宜

頭以明...

牡蠣 黃丹各一兩 加礬 四兩 為末遇夜睡時用手捏藥於瘡處擦之不一時又擦三四次後自然平復

○硫磺散 治陰囊上及兩腿上風濕瘡痒

檳榔二箇破開以黃丹二錢合在內濕紙包煨 蛇床子 硫黃各四錢 八箇

輕粉 青黛各五分 麝香少許 各為末和勻每用少許清油調抹兩掌擦熱抱囊一頃次擦兩腿上

利囊濕龍膽慢炒勿燥

○黑龍湯 治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴

龍膽草炒黑 柴胡 木通 甘草節 當歸 金銀花

皂刺 赤芍 防風 黃連吳更水炒 各等分水煎服一服

腫痛止後加川芎茯苓

附交接出血

婦人陰瘡

婦人陰瘡鬱火致損傷肝脾濕熱注如蛇如菌如鷄冠生虫腫

痛痒脫墜陰戶生瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注○陰中

挺出一條尺許如蛇痛墜出水溺澀者朝服補中益氣湯

內傷 晚服龍膽湯方見 肝湯方見 外塗藜蘆膏方見 而收○陰

中突出如菌如鷄冠四圍腫痛者乃肝鬱脾虛下陷先以補

中益氣湯加山梔茯苓車前子青皮以清肝火兼升脾氣漸

愈更以歸脾湯方見 加山梔茯苓川芎調理外塗藜蘆膏方見

○陰戶突因勞力者血虛四物湯方見 加龍骨氣虛補

中益氣湯方見 ○陰中生虫蠶如小蛆者乃濕熱甚而心氣

又鬱氣血凝滯而生宜藿香養胃湯補心湯古硫鱉方見 外用

生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃銚散方見 納陰中○

陰中生細虫痒不可忍食入臟腑即死令人發寒熱與瘡症

相似先以蛇床子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾為末入

枯礬四分之一麝香少許敷之立效○陰戶兩旁腫痛手足

不能舒伸者用四季葱入乳香末同搗成餅安陰中立效○

陰腫痛極便秘欲死者枳橘熨方見 但腫痛者四物湯方見

加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時常陰痛者四物湯方見 諸

防風○陰戶腫痛不閉者逍遙散方見 十全大補湯方見 腫

消不閉者補中益氣湯方見 腫墜者加山梔牡丹皮○濕痒

出水又痛者憂思過也歸脾湯方見加柴胡山桅牡丹芍藥
生甘草○潰爛者逍遙散經見

內症熱倦經不調食少胸滿尿澀滯昏戶腫痛不閉熱溺澀
體倦少食者補中益氣湯方見加升麻柴胡至一二錢量入茯
苓山桅○陰戶不閉小便淋瀝腹中一物攻動脹痛者逍遙
散加柴胡山桅車前子

又有交接血即來涼藥房勞當禁忌交接出血乃房室有傷肝
脾虛不藏血補中益氣湯方見外用熟艾帛裹入陰中或用
亂髮青皮燒灰敷之若出血過多見雜症者調補肝脾自愈
補心疏鯉膿滯陰戶如淋

○補心湯 治婦人陰戶生瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓
陰蝕已盡治之當補心養胃

人參 茯苓 前胡 半夏 川芎 各三 陳皮 枳殼
紫蘇 桔梗 乾姜 甘草 各五 當歸 白芍 各一
熟地 一兩 每四錢姜棗煎服如濕熱有虫者去姜蘇參
梗加苦參北艾桃仁吳茱水炒黃連

○古硫鯉丸 大鯉魚一箇去頭皮入硫黃一兩黃泥固濟火
煨烟盡為末米糊丸梧子大每二十九丸溫酒下如疰生虫
所下如柿汁臭穢及心中疝痛悶絕虛煩甚者不治

○藿香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈
藿香 薏苡仁 神麴 烏藥 砂仁 半夏 茯苓
白朮 人參 各二 萆薢 茄 甘草 各三
姜棗煎服

附骨疽

附腿上一切寒濕瘡

附骨疽毒深着骨賊風石緩不可勿賊風得熱痛以寬賊風因
風邪搏於骨髓故其痛亦徹骨遇寒則甚外症惡寒有汗痛
處常欲熱熨失治變為彎曲偏枯宜越婢湯主之方見
緩慢色黯石硬疔緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓但緩疔其熱緩
慢色紫黯久則皮肉俱爛石疽腫與皮肉相似其堅硬如
石二者初起便宜溫熱托裏補虛次乃隨症調治
附疽內痛真如錐外肉全無赤腫突粗人多因冷露侵濕熱痰

火腫家發外感因露臥風冷寒濕襲深者初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱為熱便秘者漏蘆飲子主之有不敢下者須分經內托并散在尻臀者內托羌活湯腿內近膝者漫腫木硬者內托芪朮湯腿外者內托酒前湯左腿外側漫腫長湖行步作痛以手按至骨大痛者黃連消毒散已上四方通用檳蘇散方見脚氣敗毒散方見傷寒○內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入髀樞環跳穴左右積痰瘀血搏成宜青葙膏柏湯微并服此不愈恐疽將成者急掘地坑用火燒紅沃以小便令患者赤體坐其上以被席圍抱下截便熱氣薰蒸膝理開氣血暢而愈○內傷生冷飲食寒涼藥物血凝於內飲食如常活命飲方見癰疽食少體倦者六君子湯方見脾胃加當歸藿香和因勞役傷食右腿偏腫者補中益氣湯方見內傷○內傷鬱怒腫痛如錐赤暈散漫先用活命飲方見癰疽次用八物湯方見諸虛加柴胡牡丹皮山梔○內傷勞後兩腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也補中益氣湯方見內傷加半夏茯苓芍藥○內傷房室兩腎腫硬二便不通者腎氣丸料加車前子牛膝煎服兼用十全

大補湯二方見諸虛有寒熱者逍遙散方見婦人經候○柳考附疽初起宜青皮甘草節二味煎服以行其氣或灸患處若膿已成即用火針使毒不得內潰帶生用亦無妨且不痛又易斂口

○附骨疽慢腫光色者用蜂房蛇退頭髮灰各等分為末每三錢酒調服或神應膏為丸梧子太每三十九溫酒下外仍貼之已潰者用平肌散二方俱見外科通用或狗頭骨燒烟薰之魚眼瘡亦妙

○腿上一切寒濕瘡用鴉子糞煨過為末乾糝如燥痛加黃丹少許桐油調敷凡癰疽生狀免穴者不治

附骨寒鬱漏蘆敢以并下

○漏蘆飲子 治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚眼五發癰疽目翳吹效初起如傷寒表裏症具者宜服

漏蘆 白蘆 黃芩 麻黃 枳實 升麻 甘草 朴硝各五分 大黃 一錢 水煎熱服

附疽濕熱蒼柏加以青甘

○青葙膏柏湯 治環跳穴痛不已

蒼木 黃柏各三錢 青皮半錢 甘草五分 水煎入姜汁少許調服虛者加牛膝一錢夏加黃芩八分冬加桂枝五分痛甚無汗加麻黃二分

杖瘡

杖瘡破癩止其疼定心補益是後節杖瘡於法本不當治據古方破癩去血為先杖畢即飲童便和酒不可喫茶免血攻心待神氣定後體盛者用鷄鳴散下之體薄者瘡攻寒熱惡心少食宜當歸散加柴胡羌活氣鬱加木香心腹脹痛加童便心下脹滿氣不通暢加水香檳榔外用執豆腐鋪在杖處其氣如蒸其腐即紫復以執豆腐鋪之以紫肉散盡淡紅為度出膿血潰爛者亦宜甚者內服乳香定痛散見上方隨以執酒盡量而飲虛者潰後宜大補氣血脾胃兼吞紫河車丹方見最易平復外貼黃蠟膏馬齒膏方見凡杖瘡忽乾毒攻腹內恍惚煩悶嘔吐者難治

足膝部

鶴膝風

鶴膝風如鶴之膝二陰虧損風邪入足三陰虧損風邪乘之以致內執減食肌瘦肢體攣痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然初起宜用葱熨法見外科以內消之寒熱者五積散加散方見加烏藥姜蠶已潰者獨活寄生湯方見亦有大防風湯方見亦有虛火陰血枯所以病後多此疾陽虛熱來復去者無根風火也十全大補湯方見大防風湯臍腹疼痛頭暈吐痰者八味丸方見發熱太渴面赤脉大血虛甚也古歸芪湯方見發熱陰虛形瘦發熱者腎氣丸方見痰疾二炒蒼柏散方見食少面黃者木君子湯方見津乾中氣不足者補中益氣湯方見加五味子膿清肌肉不生者八物湯方見婦人月經不調發熱口渴兩膝腫痛者腎氣丸方見蒼龜丸方見道遙散方見加牛膝杜仲黃柏

大防風湯熟地黃白朮參苓朮附片羌活獨活杜仲歸甘芍朮後鶴
膝空心膏

○大防風湯 治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴膝風或時骨
節腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後當用調補
之藥或痢後脚痛緩弱不能行履各曰痢風或兩膝腫痛脚
脛枯腊亦名鶴膝風

熟地 白朮 防風 當歸 白芍 杜仲 黃芪
附子 川芎 各三牛膝 羌活 甘草 人參 各二
姜棗煎服去風順氣活血壯筋一方無羌活有茯苓

人面瘡

人面相傳積業窳良母一施浹便出瘡象人面眼口鼻全多生
膝上亦有瘡患之者據方書皆云窳業所至須清心悔過內
服十六味流氣飲方見父者大苦參丸腎氣丸方見外用貝
母為末敷之乃聚眉閉口仍用生肌飲口而愈

大苦參丸人面於膝蓋

○大苦參丸 治人面瘡及廉瘡

苦參 四兩 防風 荆芥 白芷 川烏 赤芍 何首烏
獨活 山柰 川芎 牙皂 蔓荊子 茯苓 山藥
茯苓 黃芪 羌活 白附子 各一草烏 三錢
為末麩糊丸梧子大每三五十九丸空心温酒吞下

腎臟風瘡

腎臟風瘡有如癰初起脛上遍身攻此非廉瘡亦非外腎風瘡
乃腎虛有火血燥或思色精不出而內敗初起兩足時熱脚
眼作痛多於內脛或廉上痒極抓破成瘡久則能漸延開失
治延及脛股遍身者有之

外症瘡痒滴膿水內症潮汗痰倦如內症脯熱盜汗口燥咽乾
吐痰體瘦腰脚倦怠治以腎氣丸方見為主佐以四生散方見

若脾胃虛者補中益氣湯方見為主佐以腎氣丸四生散
又有遍身生瘡膿水淋漓兩腿尤甚體倦作痒經年不愈乃腎
虛火也八味丸方見諸虛主之○外治謝傳傷手瘡方白膠香散

白膠香敷傷手於腮尖

○白膠香散 治諸疔侵蝕日久不愈下注廉瘡疼痛內外踝生瘡 白膠香 赤石脂 枯礬各五 黃丹 乳香 沒藥 輕粉各二 為末乾糝濕則油調敷

○謝傳傷手瘡方 治脚上生瘡腫痛作痒抓破汁流或打撲成瘡者尤效 猪屎 火煨 檳榔各五片腦五分 花椒 龍骨各一 為末乾糝濕者麻油調搽有膿水加輕粉一錢

廉瘡

廉瘡腫痛濕熱甚 庄兩廉 初起焮腫作痛寒熱者屬外邪濕熱

慢腫寒熱陰分虛 慢腫作痛或不腫不痛屬三陰虛也或發寒

熱俱宜八物湯十全大補湯 脾虛挾表邪者補中益氣湯

濕內傷加桔梗白芷神虛濕熱流膿口乾少食者補中益氣湯

加茯苓芍藥朮熟加炒黑黃柏熟地挾怒氣加山梔小麥有

鬱者歸脾湯 加山梔柴胡若患處黑黯肢體惡寒飲食

少思者屬肝腎虛敗宜八味丸內熱口乾者腎氣丸 諸虛

久不愈者大苦參丸 腎臟虛風四生散 黃芪丸

外足三陽需外治內足三陰更難醫 外治外廉瘡因風濕者洗

以葱湯次用龍骨膏貼之風熱者馬齒膏濕熱者奎土膏因

血氣凝滯者小駐車丸 加乳香小許糝之 內廉瘡

初起洗以鹽湯次以蠟礬紙貼之重者桐油膏痒甚者斬艾

膏久不愈者內外通用爐灰膏 點去痂肉後貼黃蠟

膏然內必量龍服藥若誤用攻伐傷胃者亦能殺人

外廉龍骨馬齒而奎土兼除濕熱

○龍骨膏 龍骨 乳香 沒藥 陀墮各二 海鰓筋一 錢

肥皂子 燒存性 為末用綿紙雙重以針押亂孔清油調

藥夾內縛貼瘡上隔日一番兩面貼之

○馬齒膏 治三十六種風瘡多年惡瘡及廉瘡濕癬白禿枝

瘡旋加梳垢可封赤腫 馬齒首煎汁一金澄去查入黃蠟五兩慢火熬成膏塗之

○奎土膏 經年奎窻土燥濕或只用窻心土黃丹輕粉黃柏

散熟乳香沒藥散痲赤石脂生肌各等分爲末清油調成膏
用傘紙夾住貼之以綳縛定縱痒不可動直待膿瘡結痂去
之未愈再貼先以茶清洗過方貼

肉廉油艾燔紙而黃蠟能補潰瘍

○桐油膏 桐油二兩宜木毒 百草霜生肌 黃丹生肌 髮灰補陰

冷者加鹿角灰乳香各三錢同熬成膏攤油紙上貼之血虛
痛甚者尤宜如經年紫黑者先用爐灰膏去瘀

○斷艾膏 斷艾 川椒各五錢 水粉一兩 黃丹三錢 輕粉一錢
爲末熟麻油調膏隔紙貼之効

○蠟礬紙 綿紙登十二重 看瘡大小剪成方塊以紙標釘住
却用麻油二兩入川椒四十九粒慢火煎枯黑去香入槐枝四

十九寸煎枯黑去香入黃蠟一兩枯礬一錢輕粉二分俟溶
化節入煎紙入油透透勿使焦黃取起貼時用槐枝葱椒煎湯

洗拭取煎紙齊齊貼上外別用油紙緋綳緊縛週時取下近
瘡紙一重候紙取盡則瘡全愈其効如神氣虛膿多者尤宜

○黃蠟膏 香油一兩入胎髮如梅大熬消化入白膠香黃蠟

各一兩溶化入生龍骨赤石脂血竭末各一兩攪勻候冷磁
器收貯每用捏作薄片貼瘡上外以箬葉綳帛縛之三日後
番過藥貼以活血藥煎湯洗之外廉亦妙

○黃芪丸 治腎臟虛風攻注手足頭面麻痺痛痒或生瘡疥
廉瘡焮腫 黃芪 烏藥 茴香 地龍 川椒 防風

川練肉 赤小豆 白茯苓 海桐皮 歲靈仙 陳皮
各等分爲末酒糊丸梧子大每三十九空心溫酒下

脚跟瘡

附脚肚瘡及痔口瘡

脚跟瘡乃督腎部內因虧損足三陰脚跟乃督脈發源腎經過

脈內因飲食起居虧損足三陰所致或外被犬兔所咬而成
初必脚軟并跟痛一味滋補免侵尋慢腫食少者補中益氣湯

方見 補熱頭昏者逍遙散方見婦 腎氣丸咳嗽吐痰者十全
大補湯八味丸見諸風久不斂口滴盡氣血而死

○脚肚上生瘡初如粟漸大抓搔不已成片包脚相交黃水流
出痒不可忍久成痼疾難愈先用貫衆煎湯淋洗後用百藥

煎為末，津唾調，逐旋塗敷，自外而入。
 ○瘡口瘡，生於脚脛，或因物打撲而成，其瘡口狹，皮內極潤，皮薄如於膜，極痒痛，終日黃水流，延蔓而生，甚者數十年不愈。又易於染人，患者須忌房室，則易愈。用韭菜地乾地龍尿為末，入輕粉、清油，或白犬血調敷，內外腫瘡亦治。

脚發

脚發，足心或縫間，三陽易治，三陰難生。足掌或足指縫間，色赤腫痛，膿稠者，屬足三陽濕熱下注，易治。微赤微腫，膿清者，屬足三陰虧損，難治。若黑黯不腫，痛不潰膿，煩熱作渴，小便淋瀝者，陰敗未傳惡症，不治。

湧泉發熱，乃其兆，灸滋陰，可保安。治法：濕熱下注者，先用隔蒜灸，見外科及活命飲方以解蘊毒。次服補中益氣湯，方見內傷腎氣丸方以補精氣。三陰虛者，初起托裏消毒散，或托裏散，二方見加牛膝、檳榔、杜仲，或托裏消毒散，潰後太防風湯，方見十全大補湯，八味丸。陰虛足心熱者，四物湯，方見

俱見 諸虛加知母、黃柏、脾虛者補中益氣湯，若專治瘡者死。

嵌甲瘡 五指濕爛

又有嵌甲，不能行，五指濕爛如湯液。嵌甲因靴窄，研損爪甲，陷入四邊，腫爛，黃水流出，侵淫相染，五指濕爛，漸漸引上，脚跌。疱漿四起，如湯發火燒，日夜倍增，不能行動，以陳皮濃煎湯浸，良久，甲肉自相離開，輕手剪去肉中爪甲，外用蛇退一條，燒灰，雄黃四錢為末，乾糝乾者香油調敷，與甲疽條參治。
 ○脚指丫瘡，濕爛及足指角急為甲所入肉，便刺作瘡，濕爛用枯礬三錢，黃丹五分為末，糝之，或鷲掌黃皮燒灰糝之。又方用細茶、鷲爛敷之，因暑手抓，兩脚爛瘡亦宜能解熱燥故也。
 ○指縫搔痒成瘡，血出不止，用多年糞桶桶篾燒灰敷之。
 ○脚上及指縫中沙瘡，用燕窠泥略炒，黃柏二味為末，香油調敷，痛者加乳香。

脚背發

脚背發必兼消渴，輕者赤痛，猶可活。重潰色黑，名脫疽，甚重筋
 骨寧，斬割。脚背發又名脫疽，疔以其能潰脫也。亦有患於手背
 及手指者，原因膏漆房室損傷脾腎，或先渴而後發，或先發
 而後渴，輕者色赤作痛自潰，可治。先用隔蒜灸，見外科內服
 活命飲，方見癰疽或敗毒散，方見傷寒加金銀花、白芷、大黃、痛止，乃與
 托裏散，或內托十宣散，去桂加天花粉、金銀花、枝氣者，十六
 味流氣飲，三方俱見癰疽下虛者，十全大補湯。八味丸，二方見諸虛大苦
 參丸，方見入癰疽重者，色黯不痛，先用隔蒜灸，桑枝灸，二法見外科通
 用更服補藥固內，則惡肉不致上侵，庶可保生。又有內修手
 足口咬等傷，或外塗生肌涼藥，內服尅伐，兼犯房室，患處不
 潰，不痛，色黯上延，亦多致殞。重者須用利刀解去其筋，則筋
 骨出而毒得泄，又甚在指則斬去，其指在肉則割去其肉，外
 治用桐油及無名異煎一沸，入花椒一勺，着瘡大小剪葉，葉
 在內同煎浸一七，後單以此葉貼瘡上即安。

合類李氏先生醫學入門外集卷之十六終

