

庶物類纂

草屬
自一至二



第四百廿四函

五十七 内



内閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465 (3)
函號	54 1



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak



四四〇

偏精

黃精

萎蕤

卷之二

黃耆


齊莞

甘草

庶物類纂草屬總目

卷之二

七



卷之三

求總

白求

蒼求

卷之四

白芷

藁本

木香

卷之五

白芷

藁本

木香

蘿蔔

大葉芎藭

當歸

卷之六

羌活

前胡

防風

卷之七

防葵

三蔓草

三枝九葉草

小草

黃連

總

菊葉黃連

雉尾葉黃連

卷之八

苦參

白頭翁

三七

玄參

卷之九

杜衡

細辛

及己

鹿蹄草

卷之十

赤箭

地黃

牛膝

卷之十一

書帶草

繡墩草

車前

知母

白薇

卷之十二

豨莶

卷之十三

菉耳

天明精

羊屎柴

卷之十四

白茅

菅茅

蕊

石荳

青茅

卷之十五

虎薊

大薊

小薊

雞項草

卷之十六

飛廉

苦芥

卷之十七

蓍草

合歡草

卷之十八

艾

蕎蒿

牛尾蒿

齊頭蒿

蓬蒿

卷之十九

青蒿

黃花蒿

卷之二十

茵陳蒿

皤蒿

白蒿

卷之二十一

劉寄奴草

徐長卿

鬼督郵

山芹

蒴藋

卷之二十二

苜蓿

望江南

茳芏

卷之二十三

皮弁草

苦讌

六月柿

卷之二十四

芭蕉

霸王

卷之二十五

千年蘆

冬葉

卷之二十六

芷草

蘆草

卷之二十七

紅蘆花

卷之二十八

藍

總

蓼藍

莧藍

卷之二十九

苧

卷之三十

苧

野苧

卷之三十一

大麻

蕓麻

卷之三十二

棉

卷之三十三

棉

卷之三十四

棉

卷之三十五

酸桶

毛蓼

馬蓼

蠶芮草

卷之三十六

荏

水蘇

赤車使者

爵牀

薺寧

卷之三十七

荊芥

薄荷

香薷

卷之三十八

葵

卷之三十九

龍葵

龍珠

續斷

萹蓄

桃朱術

螺鱉兒

卷之四十

茺蔚

蕪菜

馬鞭草

鬼釵草

卷之四十一

蛇牀

馬蘄

龍牙草

淡竹葉

牛扁

卷之四十二

瓊田草

卷之四十三

芸草

禳香

蔣蘿

羅勒

卷之四十五

紫金牛

千年矮

木賊

接續草

麻黃

卷之四十五

蛇舍

蛇莓

鼠麴草

連錢草

積雪草

雀舌草

翦刀股

卷耳

植物類纂

卷之四十六

半邊蓮

夜光草

紫花地丁

匙頭菜

碎米薺

紫花兒

酸梅草

赤孫施

卷之四十七

金絲荷葉草

山蒿

兔兒傘

雞眼草

苦麻薹

馬唐

翻白草

委陵

物類編

卷之四十八

卷之四十八
結縷草

雀麥

燕麥

狼尾草

狗尾草

鶴觀草

地楊梅

水蔓菁

卷之四十九

翠雪草

佛甲草

百乳草

陰地厥

漆姑草

蕺草

卷之五十

蒺藜

黑蒺藜

田麻

卷之五十一

莎草

山莎

鵝不齒草

葶苈

卷之五十二

大黃

羊蹄

酸模

牽牛

卷之五十三

虎掌

天南星

斑杖

卷之五十四

半夏

由跋

卷之五十五

大戟

續隨子

五鳳草

卷之五十六

蕎薩

牙子

蓖麻

博落迴

藜草

卷之五十七

毛建草

黃堇

卷之五十八

蕨附蕨粉

毛蕨

薇

卷之五十九

貫衆

格注草

紅茂

仙人掌草

卷之六十

鳳尾草

石長生

卷柏

千年柏

萬年松

石松

地柏

卷之六十一

澤蘭

益嫋草

卷之六十二

白前

荊蒿

戴星草

長梗穀星草

卷之六十三

河白草

烏杷

金陵草

石龍芮

卷之六十四

三白草

守田

卷之六十五

蘆荻

總

蘆

荻

兼

卷之六十六

石菖蒲

卷之六十七

石菖蒲

卷之六十八

石菖蒲

卷之六十九

小菖蒲

水菖蒲

卷之七十

茭草

卷之七十一

香蒲

水燭

莞

卷之七十二

京三稜

草三稜

磚子苗

卷之七十三

龍鬚草

燈心草

蓆草

蕡

水葱草

澤瀉

薢草

龍舌草

卷之七十四

睡草

卷之七十五

蔚草

青蘋

水馬齒

水竹葉

苦草

卷之七十六

蓴

卷之七十七

荅

水粟

水鏡草

膚舌

萍蓬草

浮薺

卷之七十八

水萍

紫藻

田字草

卷之七十九

蓍

柳葉菹

陟釐

水綿

卷之八十

骨碎補

女蘿

卷之八十二

地衣
垣衣
屋遊
土馬驥
艾納
桑錢
紫衣

石韋
杏葉石韋
瓦韋
金星草
金雞腳
七星草
石蕊

卷之八十一

莓苔

總

白龍鬚

卷之八十三

黃絲草

卷之八十四

天門冬

卷之八十五

天瓜附天花粉

王瓜附王瓜粉

蕷瓜

卷之八十六

葛附葛粉

卷之八十七

蘿摩草

雀瓢

女青

卷之八十八

仙沼子

青木香

馬兜鈴

卷之八十九

茜草

卷之九十

烏蕨莓

葎草

紫葛

水葫蘆

卷之九十一

雪下紅

雪裏珊瑚

海金沙

牛尾

卷之九十二

萆薢

大蓼

犂藤

卷之九十三

鷺鷺藤

釣藤

防己

通草

卷之九十五

何首烏

卷之九十六

五味藤

金剛藤

黏魚鬚

卷之九十七

薜荔

絡石

扶芳藤

石血

卷之九十八

常春藤

螺屨草

地錦

卷之九十九

南藤

藤天蓼

檻藤

相思藤

卷之百

冶葛

藤繡毬

總計三百十八種總五種附四種不在數

庶物類纂草屬卷之一目次

甘草

黃耆

蕤羌

甘草

一名蜜甘名醫別錄一名美草同上一名蜜草同上一

名落草同上

一名國老藥性論

一名靈通

珠記

事

甘草

甘草陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沈香也國老卽帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也臣禹錫等謹按爾雅云藴大苦注今甘草也蔓延生葉似荷

青黃莖赤，有節，節有枝，相當疏引。詩唐風云采苓采苓，首陽之巔是也。藥性論云甘草君忌豬肉諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒，調和使諸藥有功，故號國老之名矣。嘉祐補註本草

甘草河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之。春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如華豆根長者三四尺麤細不定皮赤上有橫染深下皆細根也。二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用。今甘草有

數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細勑者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云薦大苦釋曰薦一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云薦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也薦與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒爲衆藥之要孫思邈論云有入中烏頭

巴豆毒甘草入腹卽定方稱大豆解百藥毒嘗試之不效乃加甘草爲甘豆湯其驗更速又備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥竝是嘗用物畏入得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辯久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨卽吐出乃用都琳藤黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小溲出都琳藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐者非毒也

崔元亮海上方治發背祕法李北海云此方神授極奇祕以甘草三兩生擣別篩末大麥麪九兩於一大盤中相和攬令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出味成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚妙又一小刀子置露中經宿平明以物攬令沫出次沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效本草圖經

甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澀似
有毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆
齒齧不破今出河東西界入藥須微炙不爾亦微涼
生則味不和宋寇宗奭

本草衍義

備急療諸藥各有相解者然難常儲今但取一種
而兼解衆毒求之易得者方甘草濃煮汁多飲之無
不生也又食少蜜佳唐王焘外臺祕要方

甘草按沈括筆談云本草註引爾雅蠶大苦之註爲
甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之

大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端
微尖而糙澀似有毛結角如相思角作一本生至
熟時角拆子扁如小豆極堅齒齧不破今出河東西
界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理
度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大徑
寸而結繫斷文者爲佳謂之粉草其輕虛細小者皆
不及之鎔積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以
架屋不識果然否也明李東壁本草綱目

本草注引爾雅云蠶大苦注甘草也蔓延生葉似荷

莖青赤此乃黃藥也其味極苦謂之大苦非甘草也
甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澀似
有白毛實作角生如相思角作一本生熟則角折子
如小扁豆極堅蕊齧不破宋沈存中

甘草曰落草曰蜜甘曰美草或曰大苦卽此也

夢溪筆談

山谷林莽間者或幸以免忽襁負嬰兒啼聲聞于外

宋鄭夾際昆蟲

草木略

兵興以來盜賊夷狄所及無噍類有先期葬避伏匿

山谷林莽間者或幸以免忽襁負嬰兒啼聲聞于外

亦因得其處于是避賊之人凡嬰兒未解事不可戒
語者率棄之道旁以去纍纍相望有教之爲綿毬隨
兒大小爲之縛置口中略使滿口而不閉氣或有力
更預蓄甘草末臨繫時量以水潰使咀味兒口中有一
物自不能作聲而綿軟不傷兒口或鏤版以揭饒州
道上己酉冬虜自江西犯饒信所在居民皆空城去
顛仆流離道上而嬰兒得此全活者甚多宋葉少蘊
避暑錄話

甘草大者如柱土人以架屋吾友唐愚士西遊親見

之

孟熙

事物類集

卷一

草屬 甘草

六

甘草存中辨。景純、大苦非甘草是也。今重秦粉草，正以西邊風勁，其根直深，故其力厚。劉客生言，西寧鎮番甘草最多，葉似天竹，但冬凋耳。根鬚直下數丈，外城成樹。清曉桐方氏

物理小識

黃耆

一名戴參。神農本草 一名戴椹。名醫別錄 一名獨椹。同上

一名芨草。同上

一名蜀脂。同上 一名百本。同上 一名

王孫論。藥性

黃耆

黃耆陶隱居云、第一出龍西、叨陽色黃白甜美、今亦難得、次用黑水宕昌者、色白肌膚麤新者亦甘溫補、又有蠶陵白水者、色理勝蜀中者而冷補、又有赤色者可作膏貼用消癰腫、俗方多用、道家不須、唐本注云此物葉似羊齒、或如葵藜、獨莖、或作叢生、今出原州及華原者最良、蜀漢不復採用之、臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒、草獨莖枝、扶疎、紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許、今原州者好、宜州寧州者

亦佳嘉祐補註本草

黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖作葉生枝蘇去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆功用竝同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以首蕷根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但首蕷根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此爲異耳唐

許裔宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而口噤裔宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如此因附著之使善醫者知所取法焉本草經

黃耆一名戴糁一名戴椹一名獨椹一名芨草一名蜀脂一名百本一名王孫生蜀郡山谷及白水漢中河東陝西出綿上呼爲綿黃耆今處處有之根長二三尺獨莖叢生枝蘇其葉闊大而青白色開黃紫花

如槐花大結小尖角長寸許味甘性微溫無毒一云
味苦微寒惡龜甲白蘚皮救饑採嫩葉燥熟換水
浸淘洗去苦味油鹽調食藥中補益呼爲羊肉明周憲王
救荒本草

黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微闊大青
白色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二
三尺以下緊實如箭筈者爲良嫩苗亦可燂淘茹食其
子收之十月下種如種菜法亦可明李東璧
本草綱目

黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微闊大青

白色開黃紫花結小尖角長寸許根長二三尺生赤
水鄉名赤水耆生白水鄉名白水耆生山西沁州綿
上名綿耆一云折之如綿故謂之綿黃耆夫耆者年
高有德之稱耆老歷年久而性不燥此藥性緩如之
故得以耆稱一云耆長也黃耆色黃爲補藥之長故
名黃耆俗作黃芪非矣明李中立
本草原始

黃耆盧之頤覈曰出蜀郡漢中今不復采惟白水原
州華原山谷者最勝宜寧二州者亦佳春生苗獨莖
叢生去地二三寸作葉扶疎狀似羊齒七月開黃紫

色花結小米角長寸許八月采根長二三尺緊實若箭筈皮色黃褐折之柔韌音忍堅柔難斷也如綿肉理中黃外白嚼之甘美可口若堅脆味苦者卽首蓿根也勿誤用別說黃耆本出綿上者爲良蓋以地產言也若以柔韌如綿爲綿而僞者亦柔韌但當下以堅脆爲別耳木耆草形類真相似只是生時葉短根橫耳清劉若金本草述

薺莞

一名莞雅爾一名葛莞同上一名杏參本草圖經一名杏葉沙參救荒本草一名白麪根同上一名甜桔梗本草綱目一名碧下盞洛陽花木記

薺

芑、芑、芑

爾雅○芑音

薺

晉郭璞註

芑、一名芑、芑

郭云、薺也、本草薺、芑陶注云、根莖都似人參、而葉小異、根味甜、又別本注云、根似桔梗、以無心爲異者是也、

宋邢昺
爾雅疏

芑、音禡、芑、音底、芑也、

宋鄭夾漈
爾雅註

芑、芑、陶隱居云、根莖都似人參、而葉小異、根味甜絕

能殺毒、以其與毒藥共處、而毒皆自然歇、不正入方

物類集

卷一

草屬

芑

二

家用也。今按別本注云：根似桔梗，以無心爲異，無毒。二月八月採根，暴乾。臣禹錫等謹按爾雅云：莞、蔑莞。釋曰：莞，一名蔑莞。郭云：莞，蔑莞也。嘉祐補注本草

莽莞，舊不載所出州土。今川蜀江浙皆有之。春生苗，莖都似人參，而葉小異。根似桔梗，根但無心爲異，潤州尤多。人家收以爲果菜，或作脯啜，味甚甘美。二月八月採根，暴乾。古方解石，多生服莽莞汁，良。又小品方療蠱，取莽莞根擣末，以飲服方寸匕，立差。本草經圖

杏參，生淄州田野，主腹臟風壅，上氣欬嗽。根似小菜根，五月內採苗葉，彼土人多用之。同上

莽莞，今陝州採爲脯，別有法，甚甘美，兼可寄遠。古人以謂莽莞似人參者是此。解藥毒，甚驗。宋寇宗奭本草衍義

莽莞，別說云：今多以蒸熟扁亂入參，但味淡爾。宋唐慎微本草證類

本草

莽莞，苗似桔梗，根似沙參，故姦商往往以沙參莽莞通亂。人參蘇頌圖經所謂杏參，周憲主救荒本草所謂杏葉沙參，皆此莽莞也。圖經云：杏參生淄州田野。

本草類纂

卷一

草屬 莽莞

三

根如小菜根，土人五月采苗葉治效，嗽上氣殺荒本草。云杏葉沙參，一名白麪根，苗高一二尺，莖色青白，葉似杏葉而小微，尖而背白，邊有叉牙，杪間開五瓣，白盤子花，根形如野胡蘿蔔，頗肥，皮色灰黑，中間白毛味甜微寒，亦有下開碧花者，嫩苗燂熟，水淘油鹽拌食，根換水煮亦可食，人以蜜煎充果，又陶弘景註桔梗言其葉名隱葱，可煮食之，治蠱毒，謹按爾雅云蕎隱葱也，郭璞註云似蘇有毛，江東人藏以爲菹亦可淪食，葛洪肘後方云隱葱草苗似桔梗，人皆食之，擣

汁飲治蠱毒，據此則隱葱非桔梗，乃薺，苗也，薺，苗甘可食，桔梗苗苦不可食，尤爲可證，神農本經無薺，止有桔梗，一名薺，至別錄始出，薺，蓋薺，桔梗乃一類，有甘苦二種，則其苗亦可呼爲隱葱也。

明李東壁
本草綱目

謹按爾雅云，莞，薺，郭註，薺，也，又云，蕎，隱葱也，郭註似蘇，有毛，蓋二物也，李東壁據肘後方云，隱葱草苗似桔梗，擣汁飲治蠱毒，以隱葱爲薺，苗誤也。

莽莞寒而利肺，甘而解毒，乃良品也。而世不知用，惜哉。按葛洪肘後方云：一藥而兼解衆毒者，惟莽莞汁濃飲二升。或煮齧之亦可作散服。此藥在諸藥中，毒皆自解也。又張鷺朝野僉載云：名醫言虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭，而齊莞而食物猶知解毒，何況人乎？又孫思邈千金方治強中病，莖長興盛，不交精出，消渴之後，發爲癰疽，有齊莞丸、豬腎齊莞湯方。此皆本草所未及者，然亦取其解熱解毒之功爾。無他義。同上

莽莞，一名杏參，一名杏葉沙參，一名蕊莞，一名甜桔梗，一名白麪根，一名隱葱苗，高一二尺，莖青白，葉似杏葉，小而微尖，背白邊有叉，牙杪間開五瓣，白盈子花，根如野胡蘿蔔，頗肥，皮色灰黑，中間白毛亦有開碧花者，嫩苗焯熟水淘可油鹽拌食，根換水煮亦可食，又可蜜煎，味甘寒無毒，解百藥毒，殺蠱毒，壓丹石，發動署毒，箭治蛇咬，辟沙蟲，短狐毒，寒而利肺，甘而解毒，藥中良品也。語云：莽莞亂入參，故詳著之。明王蓋臣

二如亭
羣芳譜

杏葉沙參 一名白麪根 生密縣山野中 苗高一二尺
莖色青白 葉似杏葉而小邊有叉牙 又似小小菜葉
微尖而背白 梢間開五瓣白盤子花 根形如野胡蘿
蔔 頗肥厚 色灰黑 中間白色味甜性微寒 本草有沙
參 苗葉根莖其說與此形狀皆不同 未敢併入條下
乃另開于此 其杏葉沙參又有開碧色花者 救飢採
苗葉 煙熟水浸淘淨油鹽調食 挖根換水煮食亦佳

明徐光啓

農政全書

碧下盞 一名薺老

宋鄭江周氏
洛陽花木記

薺老 本草圖經云 根苗都似人參而葉小異 根似桔梗而但無心潤州尤多人家收以爲果菜或作脯嚼味甚甘美

重修鎮江府志

薺老 莖似人參而葉小異 根無心類桔梗

江陰縣志

庶物類纂草屬卷之二目次

萎蕤

黃精

偏精

萎蕤

一名熒，雅爾
地節，名醫
黏，嘉祐補
女草，同說文
一名烏女，吳普
一名蟲蟬，草本
一名委蕤，上同
一名玉竹，上同
一名馬薰，上同
一名歲蕤，記異
一名娃草，上同
一名萎蕤，本草
一名女萎，本草
一名神農，一名
一名青，一名
一名歲蕤，本草
一名萎香，本草

目綱文

俗名埃及獨哥魯

萎蕤

熒、委萎爾雅○

萎音威

藥草也。葉似竹。大者如箭竿。有節。葉狹而長。表白裏青。根大如指。長一二尺。可熒。

晉郭璞
爾雅註

藥草也。一名熒。一名委萎。本草云。萎、萎蕤、一名熒。是也。葉似竹。大者如箭竿。有節。葉狹而長。表白裏青。根大如指。長一二尺。可熒。

宋邢昺
爾雅疏

萎蕤也。熒音迴。

宋鄭夾際
爾雅註

陶隱居云。按本經有女萎無萎蕤。別錄無女萎。有萎

蕤而爲用正同疑女萎卽萎蕤也惟名異爾今處處有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之唐本注云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎能効墨字乃萎蕤之功今以朱書爲白字臣禹錫等謹按爾雅云熒萎萎釋曰藥草也一名熒一名委萎葉似竹大者如箭筈有節葉

狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良陳藏器云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂洩痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如共此卽二萎功用同矣更非二物蘇乃剝出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹爲其似竹一名地節爲其有節魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地

節此卽姜蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令入
強壯和漆葉爲散主五藏益精去三蟲輕身不老變
白潤肌膚緩腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胸中寒
疹每酒後苦垂服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔
華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也蕭
炳云姜蕤補中益氣出均州日華子云除煩悶止渴
潤心肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食
無忌嘉祐補

無忌嘉祐補

姜蕤生太山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之

葉狹而長表面白裏青亦類黃精莖籜強直似竹箭籜
有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可數三月開
青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同
條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別
爾雅謂熒委萎上於爲切下入垂切郭璞注云藥草也亦無女
萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條
蘇恭云卽此女萎今本經朱書是女萎能効黑字是
萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞
下蠶下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治

虛勞小黃耆酒云下痢者加女姜詳此數方所用乃似中品女姜緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女姜及古今錄驗治身體瘻瘍斑剥女姜膏乃似朱字女姜緣其主中風不能動搖及去姦好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治腳弱鼈甲湯並用姜蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱姜蕤飲又主虛風熱發卽頭熱姜蕤丸乃似此字姜蕤緣其主虛熱溼毒腰痛故也三者主治既白則非一物明矣然陳藏

器以爲更非二物是不然此女姜性平味甘中品女姜味辛性溫性味既殊安得爲一物又云姜蕤一名地節極似偏精疑卽青黏華佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以爲信然耳本草圖經

謹按本經女姜卽歲蕤也中品女姜乃別是一種偶同其名耳如黃精一名白及而別又有白及非

一物矣諸說緣名字相同終致紛紜

姜蕤處處山中有之其根橫生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相值亦可采根種

乏極易繁也嫩葉及根並可煮淘食

明李東璧本草綱目

姜蕤性平味甘柔潤可食故朱肱南陽活人書治風

溫自汗身重語言難出用姜蕤湯以之爲君藥予每

用治虛勞寒熱痞瘧及一切不足之證用代參耆不

寒不燥大有殊功不止下子去風熱溼毒而已此昔人

所未聞者也藏器曰陳壽魏志樊阿傳云青黏一名

黃芝一名地節此卽姜蕤極似偏精本功外主聰明

調血氣令人強壯和漆葉爲散服主五臟益精去三

蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉

嵇紹有胸中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾用昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也頌曰陳藏器以青黏卽葳蕤世無識者未敢以爲信然時珍曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精與此說不同今攷黃精姜蕤性味功用大抵相近而姜蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同一名一名地節與姜蕤同名則二物雖通用亦可同上

姜蕤稟天地清和之氣而得稼穡之甘故本經味甘平無毒主諸不足久服好顏色潤澤輕身不老別錄

又主心腹結氣虛熱腰痛，革中寒目痛皆爛淚出甄權主內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之日華子謂其除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛詳味諸家所主則知其性本醇良氣味和緩譬諸盛德之人無往不利終始一節故可長資其利用而不窮正如斯藥之能補益五臟滋養氣血根本既治餘疾自除夫血爲陰而主駐顏氣爲陽而主輕身陰精不足則發虛熱腎氣不固則見骨痿及腰腳痛虛而火炎則頭痛不安目痛皆爛淚出虛而熱壅

則煩悶消渴上盛下虛則革中寒甚則五勞七傷精髓日枯而成虛損之證矣以一藥而所主多途爲効良夥非由滋益陰精增長陽氣其能若是乎迹其所長殆亦黃精之類歟其主中風暴熱不能動搖跌筋結肉溼毒等證皆是女萎之用以本經二物混同一條故耳或謂卽青黏理或有之純而不駿和而不偏有益無損故無簡誤昔彭城樊何少師事華佗佗授以漆葉青黏散服之利五藏去蟲輕身益氣年至五百餘歲青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃

芝主理五藏益精氣本出於迷入入山見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿祕之人見阿之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復有中人識青黏者或云卽黃精之正葉者又云卽萎蕤明繆仲醇本草經疏

歲蕤草一名麗草又呼爲女草江浙中呼娃草美女

曰娃故以爲名梁任昉述異記

謹按酉陽雜俎續集又作亦浙作湖呼娃草作呼

爲娃草

按嘉祐補注本草女萎條注引陳藏器云女萎萎蕤

二物同傳陶云同是二物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止瀉之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂瀉痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此卽二萎功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹爲其似竹一名地節爲有節魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此卽萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆爲散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有

胷中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人服之以告樊阿服之百歲右予少時讀後漢書三國志華佗傳皆云佗弟子樊阿從佗求下可服食益於人者佗授以漆葉青黏散漆葉屑一升青黏屑十四兩以是爲率言久服去三蟲利五藏輕體使入頭不白阿從其言壽百餘歲漆葉處皆有青黏生於豐沛彭城及朝歌魏志注引佗別傳云青黏一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳

輒語阿阿大祕之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之遂責阿所服因醉亂誤道之法一施人多服者皆有大驗而後漢注亦引佗別傳同此文但黏字書黏字相傳音女廉反然今人無識此者甚可恨惜吾詳佗文恨惜不識之語乃章懷太子贊所云也吾性好服食每以問好事君子莫有知者紹聖四年九月十三日在昌化軍借嘉祐補注本草乃知是女姜喜躍之甚登卽錄之但恨陶隱居與蘇恭二論未決恭唐人今本草云唐本者皆恭注也詳其所論多立異又

殊喜與陶公相反。幾至於罵者，然細考之，陶未必非。恭未必是。予以謂隱居精識博物可信，當更以問。能者若青黏便是。姜蕤豈不一大慶乎？過當錄此以寄子由同講求之。

辨漆葉青黏散方
○宋蘇東坡文集

姜蕤本草一名女萎，一名熒，一名玉竹，一名馬薰。生太山山谷及舒州滁州均州今南陽府馬鞍山亦有。苗高一二尺，莖斑葉似竹葉闊短而肥厚，葉尖處有黃點，又似百合葉，卻頗窄小。葉下結青子，如板粒，大其根似黃精而小異節，上有顏味甘性平無毒，救飢易繁衍者。

清陳淏子
祕傳花鏡

按姜蕤雖曰滋益陰精，與地黃同功，增長陽氣，與人參同力，潤而不滑，和而不偏，譬諸盛德之人，無處不安。故神農收爲上品，但計薄而不能如地黃之濃厚，力小而不能如人參之大補，性平和緩，難圖急效，陰

採根，換水，煮極熟食之。

明徐光啓
農政全書

姜蕤處處山中皆有其根，橫生莖，筍強直似竹箭筍，而有節，葉狹而長，表白裏青，亦類黃精，多鬚大如指，長一二尺，三月中開青花，結圓實，亦可分根種，極易繁衍者。

按姜蕤雖曰滋益陰精，與地黃同功，增長陽氣，與人參同力，潤而不滑，和而不偏，譬諸盛德之人，無處不安。故神農收爲上品，但計薄而不能如地黃之濃厚，力小而不能如人參之大補，性平和緩，難圖急效，陰

陽並資未有專功較之地黃之滋陰人參之補元已屬霄壤矣豈可仗此以代挽回垂絕之藥乎

清馮兆張錦囊

祕錄

葳蕤風溫痞瘧外感症也虛勞不足內傷症也一切爲宜今大爲時用但脾氣寒滑胃有溼痰者不宜用

清王遜醫林四書

昂按葳蕤溫潤甘平中和之品若蜜製作丸服之數斤自有殊功與服何首烏地黃者同一理也若僅加數分于煎劑以爲可代參耆則失之遠矣大抵此藥

性緩久服方能見功而所主者多風溼虛勞之緩症故臞仙以之服食南陽用治風溫千金外臺亦間用之未嘗恃之爲重劑也若急虛之症必須參耆方能復脉回陽斯時卽用葳蕤斤許亦不能敵參耆數分也時醫因李時珍有可代參耆之語凡遇虛症輒加用之曾何益于病者之分毫哉拙著方解欲採葳蕤古方可以入補劑者終不可得則古人之罕用亦可見矣

清注昂增訂本草備要

或問葳蕤功用甚緩今人比于人參之補益謂人參

無物類纂

卷二

草屬 萎蕤

十一

之功驟而無力、歲蕤之功緩而有成、然乎否乎、嗟乎、歲蕤人參烏可同日而論、人參有近功更有後力、豈歲蕤之可比、惟是歲蕤功緩久服實有專效、如中風痰症佐人參爲調理之藥、殊有益耳、清陳士鐸本草新編

黃精

一名重樓、名醫別錄、一名菟竹同上、一名雞格同上、一名救窮同上、一名鹿竹同上、一名米鋪嘉祐補註本草、一名姜蕤本草圖經、一名仙人餘糧同上、一名苟格同上、一名垂珠同上、一名馬箭同上、一名白及同上、一名戌己芝五符經、一名黃芝瑞草經、一名龍衛廣雅、一名狗格通志略、一名筆管菜救荒本草、一名野生薑性賦、一名蒙筌本草、一名米鋪同上、一名山薑青囊藥、一名山生薑增訂本草備要

俗名柰而哥由里

黃精

黃精陶隱居云今處處有二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲穢既節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而爲仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦爲奇事唐本注云黃精肥地生者卽大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小

者、肌理形色都大相似。今以鬼臼黃連爲比，殊無鬚
鬚。又黃精葉似柳及龍膽，徐長卿輩而堅，其鉤吻蔓
生殊非比類。今按別本注今人服用以九蒸九暴爲
勝，而云陰乾者恐爲爛壞。臣禹錫等謹按抱朴子云
一名乘珠，服其花勝其實。其實勝其根，但花難得，得
其生花十斛乾之，纔可得五六斗耳。而服之日可三十
合，非大有役力者不能辨也。服黃精僅十年乃可得
其益耳。且以斷穀不及求求餌，令人肥健可以負重，
涉險，但不及黃精甘美易食。一年之時可以與老小

代糧，人食之謂爲米脯也。廣雅云黃精龍銜也。永嘉
記云黃精出崧陽永寧縣。藥性論云黃精君陳藏器
云黃精陶云將鉤吻相似，但一善一惡耳。按鉤吻卽
野葛之別名。若將野葛比黃精，則二物殊不相似。不知陶公憑何所說。其葉偏生不對者，爲偏精。功用不如正精。蕭炳云黃精寒。日華子云補五勞七傷，助筋
骨，止飢耐寒暑，益脾胃，潤心肺，單服九蒸九暴食之。
駐顏入藥生用嘉祐補註本草

黃精舊不出州郡，但云生山谷。今南北皆有之。

嵩山茅山者爲佳。三月生苗，高一二尺以來，葉如竹葉而短，兩兩相對，莖梗柔脆，頗似桃枝。本黃末赤，四月開細青白花，如小豆花，狀子白如黍，亦有無子者。根如嫩生薑黃色。二月採根，蒸過暴乾用。今通八月採山中，人九蒸九暴作果賣，甚甘美而黃黑色。江南人說黃精苗葉稍類鉤吻，但鉤吻葉頭極尖而根細，蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類，恐南北所產之異耳。初生苗時，人多採爲菜茹，謂之畢菜，味極美，採取尤宜。辨之隋羊公服黃精法云：黃精是芝草之精也。一

名萎蕤，一名仙人餘糧，一名苟格，一名菟竹，一名垂珠，一名馬箭，一名白及。二月三月採根，入地八九寸爲上，細切。一石以水二石五斗煮去苦味，濾出囊中壓取汁，澄清再煎如膏乃止。以炒黑豆黃末相和令得所，搥作餅子，如錢許大，初服一枚，日益之，百日知其實。花生十斛，乾之可得五六斗，服之十年乃可得益。又博物志云：天老謂黃帝曰：太陽之草名黃精，花勝之可以長生。世傳華佗漆葉青黏散云：青黏是黃精。

之正葉者書傳不載未審的否也

本草圖經

靈芝瑞草經黃芝卽黃精也

宋唐慎微證類本草

謹按嘉祐補註本草云魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此卽萎蕤極似偏精觀之則黃精萎

蕤俱有黃芝之名

黃精野生山中亦可劈根長一寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如萎蕤俗采其苗燂熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青黏是萎蕤

見萎蕤發明下又黃精鉤吻之說陶弘景雷數韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今攷神農本草吳普本草並言鉤吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎按此但以黃精鉤吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相對與神

農所說鈎吻不合恐當以蘇恭所說爲是而陶雷所說別一毒物非鈎吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鈎吻條明李東壁本草綱目

謹按鈎吻有三種一種灌木類莖赤葉似黃精葉

開細花微黃結子作穗淡紅色一種苗葉似白芷大葉芎藭一種卽野葛也並大毒殺人俱名鈎吻黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名曰黃精餌而食之可以長生太陰之草名曰鈎吻不可食入口立死人信鈎吻之殺

入不信黃精之益壽不亦惑乎周日用草既殺人入無驗則益壽不可信矣○張華博物志

黃精曰重樓曰菟竹曰雞格曰救窮曰鹿竹曰龍衡曰萎蕤曰狗格本草作苟格曰垂珠曰馬箭曰白芨陶弘景謂似鈎吻非也似蘿荷宋鄭夾際昆蟲草木略

黃精果仲春叢采根九蒸九暴擣如飴可作果食又細切一石以水二石五斗煮去苦味濾入絹袋壓汁澄之再煎如膏以黃米作餅約二寸大客至可供二枚又采苗可爲菜茹隋羊公服法芝草之精也一名

仙人餘糧其補益可知也。

宋林洪山家清供

臨川有士人唐遇虎其所使婢婢不堪其毒乃逃入山中久之糧盡飢甚坐水邊見野草枝葉可愛卽拔取灌水中連根食之甚美自是恒食久之遂不飢而更輕健夜息大樹下聞草中獸走以爲虎而懼因得急上樹杪乃生也正爾念之而身已在樹杪矣及曉又急遁下平地又歛然而下自是意有所之身輒飘然而去或自一峰之一峰頂若飛鳥焉數歲其家人伐薪見之以告其主使捕之不得一日遇其在絕壁

下卽以網三面圍之俄而騰上山頂其主亦駭異必欲致之或曰此婢也安有仙骨不過得靈藥餌之爾試以盛饌多其味令其香美致其往來之路觀其食否果如其言常來就食食訖不復能遠去遂爲所擒具述其故問其所食草之形狀卽黃精也復使尋之遂不能得其婢數年亦卒

宋徐鉉稽神錄

黃精一名黃芝一名玉芝草一名戊己芝一名兔竹一名鹿竹一名龍銜一名雞格一名米鋪一名重樓一名野生薑一名救窮草一名仙人餘糧南北皆有

嵩山茅山者佳根苗花實皆可食三月生苗高一二尺葉如竹而短兩兩相對嫩苗采爲茹名筆管菜甚美莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花如小豆花結子白如黍米粒根如嫩生薑而黃肥地者大如拳薄地僅如拇指純得土之冲氣而秉乎季春之令味甘平無毒補中益氣除風溼安五臟久服輕身延年不飢明王蓋臣二
如亭羣芳譜

種植三月間發根長二寸稀種膏腴地一年後極稠

子亦可種冬取其根同上

顧紀秦時建阿房宮采木者偶食黃精天蒜不覺竦身飛上就山下人家裁詩云酒盡君莫酷壺傾我當發城市多囂塵還山弄明月今平樂志所載紫山木客事蓋附會此說余昔在昭州常詢之陶偉西明府云少時聞父老言曾有入見之今久不聞矣張七澤〇

上同

黃精苗俗名筆管菜一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘糧一名垂珠一名馬箭一名白芨嵩山茅山者佳根生肥地

者大如拳薄地者大如拇指葉似竹葉或兩葉或三葉或四五葉俱皆對節而生味甘性平無毒又云莖光滑者謂之太陽之草名曰黃精食之可以長生其葉不對節莖葉毛鈎子者謂之太陰之草名曰鉤吻食之入口立死又云莖不紫花不黃爲異救饑採嫩葉熿熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食山中人採根九蒸九暴食甚甘美其蒸暴用一瓮去底安釜上裝置黃精令滿密蓋蒸之令氣滯卽暴之如此九蒸九暴令極熟若不熟則刺入咽喉久食長生辟穀其生

者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食他食能長服之止三尺服三百日後盡見鬼神餅必升天又云花實極可食罕得見至難得明徐光啓農政全書

黃精苗玄扈先生曰嘗過根本勝藥苗亦恆蔬同上四時類要曰二月擇取葉相對生者是真黃精肇長二寸許稀種之一年後甚稠種子亦得其葉甚美入菜用其根堪爲煎水與黃精仙家所重

昔臨川一士人家婢有罪逃入深山中見野草枝葉可愛拔其根啖之久而不餓夜宿大樹下聞草中動

以爲虎懼而上樹避之及曉下平地歛然凌空若飛鳥焉如是數歲家人采薪見之捕之不得乃以酒餌置往來路上婢果來食食訖遂不能去與俱歸指所食之草視之乃黃精也夫人豈必盡有仙骨但能服食靈藥便可長生矣彼山麋野鶴壽皆千歲豈必修道煉形哉惟不食煙火耳明陳雷謝肇淛五雜組

黃精二月生苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相向莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色

八月採山中人九蒸九曝作果甚甘美

八閩通志

黃精產山谷中其葉其莖皆類薑本草謂久服輕身食法須九蒸九曝不爾戟喉

汀州府誌

黃精產山谷中木葉皆類薑同安永春有

泉州府志

黃精出茅山九蒸九曝服之駐顏陶隱居云爲仙經所貴根葉花實皆可鮮服

重修鎮江府志

黃精封川有之生崖壁上如竹葉服其根可長生

肇慶府志

黃精鉤吻絕似黃精但葉有毛鉤子二箇是認別處

志

若誤服能害人

萬曆杭
州府志

黃精上品仙藥岳山頗有之

衡岳志

黃精九蒸九曝服之駐顏隱居云爲仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜

元劉大彬
茅山志

耳此物雖處處有之惟以天台鴈蕩者爲佳天台鴈蕩又以下絕頂不聞雞犬之聲者爲上品性中和

鴈山志

黃精俗名山薑

青囊藥性賦

黃精似薑而一幹對分葉長尺許本草謂如竹葉不

肖也初苗名筆管菜其偏精卽萎蕤華佗告樊阿之青黏也瀨湖極稱萎蕤功竝人參神隱有萎蕤餅法比黃精葉狹而長表白裏青莖直如箭筈有一節三月開青花一結圓實○清曉桐方氏物理小識謹按偏精乃黃精之不葉相對者與萎蕤別也萎蕤葉闊而短青白色此云葉狹而長綠誤以偏精爲萎蕤故也

黃精山谷土肥俱有茅山嵩山者良莖類桃枝脆柔一枝單長葉如竹葉略短兩節對生花開似赤豆結實如白黍米陶隱居曰葉不相對者爲偏精一云卽

歲蕤偏精不如正精之有効種法與地黃同冬月根與嫩薑一般又有一種鉤吻卽野葛也相似實非能殺人清石巖逸叟增定致富奇書

鎮按予買黃精見有二種一種條直多節者味甘一種曲屈亦多節如瘦薑味甘苦而形微大賣者云皆是黃精雖未見其葉與苗其曲屈如薑者是黃精條直多節是姜蕤矣女萎近地想未獲見故人不識既云功用相同亦無妨通用清何鎮本草綱目類纂必讀

黃精俗名山生薑

清汪昂增訂本草備要

偏精

偏精

陳藏器云、黃精、其葉偏生、不對者爲偏精、功用不如

正精、嘉祐補

註本草

