


# 庶物類纂

草屬  
自六至八



容

共付




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

C Y M



圖四〇中



防葵

防風



前胡



庶物

類纂草屬卷之六目次

羌活

羌活

一名獨活神農本草一名羌青同上一名護羌使者

同上一名胡王使者別錄名醫一名獨搖草同上一名

山前獨活本草圖經

俗名施施烏獨山城州又名烏獨貌篤已同上

羌活

獨活、陶隱居云、藥名無豚實、恐是蟲實、此州郡縣並是羌活、羌活形細、而多節軟潤、氣息極猛烈、出益州北部西川爲獨活、色微白、形虛大、爲用亦相似、而小不如其一莖直上、不爲風搖、故名獨活、至易蛀、宜密器藏之、嘉祐補註本草

獨活、羌活出雍州川谷、或隴西南安、今蜀漢出者佳、春生苗葉如青麻、六月開花作叢、或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脈中生此草得風

不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此爲真者而市人或擇羌活之大者爲獨活殊未爲當大抵

此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲爲謬矣本草圖經

獨活以羌中來者爲良故有羌活胡王使者諸名乃一物二種也正如川芎撫芎白术蒼术之義入用微有不同後人以爲二物者非矣明李東壁本草綱目

獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極大羌活有曰如鬼眼者

尋常皆以老宿前胡爲獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣入亦謂之水白芷用充獨活解散亦或用之不可辨上同

獨活曰羌青曰護羌使者曰胡王使者曰獨搖草得風不搖無風自動雖與羌活異條而亦曰羌活宋鄭夾漈

昆蟲草木畧

王右軍帖云獨活無風則搖有風不動石脾入水則乾出水則溼出水則溼可見入水則乾何自知之近

年夷堅志序其畧云葉晦叔聞於劉季高有估客航海不覺入巨魚腹中未能死遇其開口吸水時適木工在乃取斧折斫魚魚覺痛躍身入大洋舉船人及魚皆死或戲難之曰一舟皆死何人談此事於世乎類前說宋周輝清波雜志

婦人疾莫大於產蓐倉卒爲庸醫所殺者多矣亦不素講故也舊嘗見杜任作醫準一卷其一記郝貢子婦產四日瘓癰戴眼角弓反張任以爲瘻病與大豆柴胡湯獨活湯而愈政和間余妻纔分娩猶在蓐中

忽作此症，頭足反接相去幾一尺，家人驚駭以數婢強拗之不直，適記此方，而藥囊有獨活，乃急爲之召醫，未至，連進幾劑，遂能直。醫至，則愈矣，更不復用。大豆柴胡湯不可不廣告人。二方皆在千金第三卷。宋葉少蘊避暑錄話

獨搖草有八：一羌活、一鬼臼、一鬼督郵、一天麻、一薇蘅、一白楊、一移楊。又媚藥有無風獨搖草，又抱朴子云：獨搖芝，一名薇蘅。智攷：薇蘅即糜衡，白楊即移楊，除此共八。

明方以智通雅

獨搖草，一名獨活，多生於嶺南及蜀漢川谷中。春生苗葉，夏開小黃花，一莖直上，有風不動，無風自搖。其頭如彈子尾若烏尾，而兩片關合間，每見人，輒自動搖。俗傳佩之者能令夫婦相愛，雖非異卉，亦自有一種風致。可取根入藥用。清陳淏子秘傳花鏡

按本經止有獨活之條，謂其爲一名羌活，一名羌青。一名護羌使者，是也。因此種生於雍州川谷或隴西，南竝是羌地，故本經所謂羌活者即是獨活，非二種也。然陶隱居言羌活出羌地，而益州西川者爲獨活。

是又一物而二種矣。時珍歷據先哲諸說而曰：獨活羌活乃一類二種。以中國者爲獨活，西羌者爲羌活。正如川芎、撫芎、白术、蒼术之義，入用微有不同。後人以爲二物者非矣。愚謂既云非一物，即當根據本經以爲用，奈何鶻突復以羌活屬羌，獨活屬蜀，就異地之所產分之爲二乎？但川中所產或另是一種獨活，並屬可用耳。今尊本經以獨活居前，而後亦另出羌活，因其用之有別，難以滾同論也。清劉若金本草述

前胡

俗名他尼石里

山城州

前胡

前胡陶隱居云前胡似茈胡而柔軟爲療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下溼地出吳興者爲勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺陸等處皆好七八月採外黑裏白

嘉祐補注本草

前胡舊不著所出州土。今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之。春生苗青白色似斜蒿。初出時有白芽長三四寸。味甚香美。又似芸蒿。七月內開白花與蔥花相類。八月結實。根細青紫色。二月八月採暴乾。今鄜延將來者大與紫胡相似。但柴胡赤色而脆。前胡黃而柔軟不同耳。一說今諸方所用前胡皆不同。京師北地者色黃白枯脆絕無氣味。江東乃有三四種。一種類當歸皮班黑肌黃而脂潤氣味濃烈。

一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐爲一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬擣服之甚下膈解痰實然皆非前胡也。今最上者出吳中。又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者。前胡按孫愐唐韻作渝胡名義未解。明李東壁本草綱目圖經前胡有數種惟以苗高一二尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開繁白花類蛇牀子花其根皮黑肉白有香氣爲真大抵北地者爲勝故方書稱

北前胡云同上

前胡生陝西漢梁江淮荆襄江寧成州諸郡相孟越  
衢婺睦等州皆有今密縣梁家衝山野中亦有之苗  
高一二尺青白色似斜蒿味甚香美葉似野菊葉而  
瘦細頗似山蘿蔔葉亦細又似芸蒿開夥白花類蛇  
牀子花秋間結實根細青紫色一云外黑裏白味甘  
辛微苦性微寒無毒半夏爲之使惡阜莢畏藜蘆救  
飢採葉燥熟換水浸淘淨油鹽調食明徐光啓農政全書

前胡似此胡而柔軟八閩通志

前胡色似斜蒿葉如野菊而細瘦

重修靖江縣志

前胡即全胡

清釋傳傑癟瘍全書

防風

一名銅芸神農本草

一名荀草別錄

一名百枝同上

一名屏風同上

一名簡根同上

一名百蜚同上

一名

珊瑚菜本草綱目

一名山花菜重修鎮江府志

俗名也埋尼摩施摩近江州

又名也埋折里伊勢同上

又名客華賴尼摩施摩伊勢

防風

防風陶隱居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵卽近琅邪者鬱州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用卽近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好俗用療風最要道方時用唐本注云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云义頭者令人發狂义尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄

陽義陽上蔡元無防風陶乃安注爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根嘉祐補註本草防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖淡而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽五月開細白花中心攢聚作大房似蕪蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又大有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭

風眩痛又宋毫間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

本草  
圖經

防風江淮所產多是石防風生于山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚菜其根粗醜其子亦可種吳綬云凡使以黃色而潤者爲佳白者多沙條不堪明李東壁本草綱目

防風一名銅芸一名茵草一名百枝一名屏風一名

簡根一名百莖生同州沙苑川澤邯鄲琅邪上蔡陝西山東處處皆有今中年田野中亦有之根土黃色與蜀葵根相類稍細短莖葉俱青綠色莖淡而葉淡葉似青蒿葉而闊大又似米蒿葉而稀疎莖似荀香開細白花結實似胡荽子而大味甘辛性溫無毒殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂羌花又名石防風亦療頭風眩痛又有义頭者令人發狂义尾者發癇疾救飢採嫩苗葉作菜茹燥熟極爽口明徐光啓農政全書

太原晉陽以北生屏風草

晉張華博物志

青州防風子可亂華機

唐段成式酉陽雜俎續集

雞頭一斗用防風四兩換水浸之久久益佳他果棗以防風水浸之經月不壞陳彥和每用之至和初京師大疫太醫進方有用犀角內出二株解之其一卽通天犀也內侍御舜舉請以爲御所服帶上曰豈急於服御而不以療民立命碎之鐵鍊礮金銀百十年不壞以椎阜角則一夕碎破鞭以葦馬愈久愈潤以擊枝隨卽折裂

宋劉政暇日記

防風苗色紅如燕脂可作菹

宋陸游劍南詩稿

山花菜生巖石間紅莢可愛味辛爽或云卽防風苗

重修鎮江府志

防風一名蕡草根黃莢葉俱青綠色類青蒿差短小

江陰縣志

防風葉似青蒿而矮根與蜀葵相類種法與種菜同五月開細白花花心攢聚如蒔蘿子如胡荽苗可食

爽口去風

清石巖逸叟增定致富奇書

防葵

一名藜蓋神農本草一名房慈名醫別錄一名爵離上同

一名農果同上一名利茹同上一名方蓋同上

俗名樹防風

防葵

防葵陶隱居云北信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沈爾而狼毒陳久亦不能沈矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沈水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者爲鄰蜀土也嘉祐補註

草本

防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者爲鄰蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一莖其端開花如蕙花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沈水陶隱居云與狼毒同根但置水不沈耳今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣三月三日採六月開花卽結實採根爲藥本草圖經

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒

根同但置水中不沈爾然此二物善惡不同形質又別陶旣爲此說後人因而用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

宋唐慎微  
證類本草

防葵唐時龍西成州貢之蘇頌所說詳明可據明李東璧  
本草綱目

防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂按

難經云重陽者狂、脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎？是豈寒而無毒者乎？不然，則本經及蘇恭所列者，是防葵功用而別錄所列者，乃似防葵之狼毒功用，非防葵也。狼毒之亂防葵，其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘕、鼈瘕，大方中多用防葵，皆是狼毒也。同上

庶物類纂草屬卷之七目次

三蔓草

三枝九葉草

小草

黃連

總

菊葉黃連

雉尾葉黃連

草屬

三蔓草

一

三蔓草

一名巴戟天神農本草經

一名不凋草本草圖經

一名老

鼠刺溫州府志

三蔓草

巴戟天陶隱居云今亦用建平寧都者狀如牡丹而細外赤內黑用打去心唐本注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者爲勝臣禹錫等謹按藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之日華子云味苦安五藏定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅

硬難擣

嘉祐補註本草

巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗云三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色爲良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煎欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土

圖經

謹按本草述云米屑爲摻

巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多偽者擊破其中雖紫又有微白摻如粉色理小暗也

本草

色宋寇宗奭  
本草行義

天巴戟本草云出歸州山谷中微溫無毒二八月可

採湖廣

總志

巴戟卽老鼠刺根溫州

府志

三枝九葉草

一名淫羊藿

神農本草

一名剛前

同上

一名黃連祖

吳普本草一名千兩金

同上

一名乾雞筋

同上

一名放

枝草

同上

一名棄杖草

同上

一名仙靈脾

本草圖經

俗名異革里忽索

山城州

三枝九葉草

澑羊藿陶隱居云服此使人好爲陰陽西川北部有澑羊一日百遍合蓋食藿所致故名澑羊藿唐本注云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也

嘉祐補註本草

澑羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細

經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一

二尺許根葉俱堪使

本草

圖經

淫羊藿生大山中一根數莖莖粗如線高一二尺一莖三桿一桿三葉葉長二三寸如杏葉及豆藿面光背淡甚薄而細齒有微刺

明李東壁本草綱目

別錄曰淫羊藿出上郡陽山山谷今所在皆有蘇氏曰今江東陝西泰山漢中湖湘間亦有李氏曰一根數莖莖細極堅高二三尺一莖三桿一桿三葉長二三寸如豆藿葉如杏葉面光背淡邊有細齒薄而有

刺四月開花白色亦有紫色者碎小獨頭經冬不凋根似黃連色紫多鬚羊食此草而淫故曰淫羊藿以形似葉也蜀本草言生處不聞水聲者更良修治以夾刀夾去葉四畔花枝用酒浸曬乾用

明倪朱謨本草彙言

仙靈脾本草名淫羊藿一名剛前俗名黃德祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草俗又呼三枝九葉草生上郡陽山山谷及江東陝西泰山漢中湖湘汾州等郡并永康軍皆有之今宿縣山野中亦有苗高二尺許莖似小豆莖極細緊葉似杏葉頗長近莖皆有一缺

又似菜豆葉亦長而光稍間開花白色亦有紫色花作碎小獨頭子根紫色有鬚形類黃連狀味辛性寒一云性溫無毒生處不聞水聲者良暮蕷紫芝爲之使救飢採嫩葉燥熟水浸去邪昧淘淨油鹽調食明徐光啟農政全書

謹按黃德祖本草作黃連祖

小草

一名蔓繞爾雅一名棘莧同上一名遠志

神農本草一

名細草同上

小草

夢繞棘蕘

爾雅○夢烏了切  
蕘音宛

今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣

雅云

晉郭璞  
爾雅註

藥草也夢繞一名棘蕘郭云今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云者案本草遠志一名細草其葉名小草陶注云小草狀如麻黃而青今注云遠志莖葉似大青而小廣雅云棘蕘遠志也其上謂之小草是也宋邢昺爾雅疏

蕪莞音杏，寃遠志也。

宋鄭夾漈爾雅註

遠志陶隱居云：按藥名無齊蛤，恐是百合。寃旬縣屬兗州濟陰郡。今猶從彭城北蘭陵來用之，可去心取皮。今用一斤正得三兩皮。爾市者加量之。小草狀似麻黃而青。遠志亦入仙方藥用。唐本注云：藥錄下卷有齊蛤，卽齊蛤元有，不得言無。今陶云恐是百合。非也。今注遠志莖葉似大青而小比之麻黃。陶不識爾臣禹錫等謹按爾雅云：蕪繞棘莞。注今遠志也。似麻黃赤華葉銳而黃，其上謂之小草。

嘉祐補註本草

遠志生泰山及寃旬川谷。今河陝京西州郡亦有之。根黃色形如蒿根。苗名小草似麻黃而青又如葦豆葉亦有似大青而小者。三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾。今云曬乾用。泗州出者花紅根葉俱大於它處。商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳。古方通用遠志小草。今醫但用遠志稀用小草。本草圖經遠志有大葉小葉二種。陶弘景所說者小葉也。馬志所說者大葉也。大葉者花紅。明李東壁本草綱目遠志主益智惠而強志故以爲名。一名蕪繞。一名棘遠志。主益智惠而強志故以爲名。一名蕪繞。一名棘。

莞其葉名小草亦目其細小也

莞烏了反音杏大元反○唐顏師古急就篇

注

遠志一名棘莞一名蘿繞一名細草生太山及寃句川谷河陝商齊泗州亦有俗傳夷門遠志最佳今容縣梁家衝山谷間多有之苗名小草葉似石竹子葉又極細開小紫花亦有開小紅白花者根黃色形如蒿根長及一尺許亦有根黑色者根葉俱味苦性溫無毒得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤蟆螬救飢採嫩苗葉燥熟換水浸去

苦味淘淨油鹽調食及掘取根換水煮浸淘去苦味去心再換水煮極熟食之不去心令人心悶明徐光啓農政

書全

草屬

黃連

黃連

一名王連

神農本草

一名支連

藥性論

黃連

黃連陶隱居云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹按去毛全如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生唐本注云蜀道者麤大節平味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者爲勝臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生二葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不高人許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不

連珠今秦地及杭州柳州者佳

嘉祐補註本草

黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者爲勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芥子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採

本草圖經

黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州

月根緊始堪採

本草圖經

者爲良藥物之興廢不同如此大抵有一種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色淡黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

明李東壁本草綱目

丙子寒食日寶積長老曇穎言惠州澄海十五指揮使姚歡守把阜民監熙寧中趙熙明知州巡檢姓申者與知監俞懿有隙吏士與監卒忿爭遂告監卒反熙明爲閉衙門出申付巡檢往討之歡執杖立監門白巡檢以身任監卒不反乞不交鋒巡檢無以奪爲歛兵而止是日微歡惠州幾殆歡今年八十餘以南

安軍功遷雄畧指揮使。老子廣州。鬚髮不白。自言六十歲患癬疥。周匝頂踵。或敷服黃連。遂愈。久服故髮不白。其法以黃連去頭酒浸一宿。焙乾爲末。蜜丸如桐子。大空心日午臨卧。酒吞二十九。服黃連法。宋

蘇東坡文集

觀比聞。公以眼疾。飲黃連至十數兩。猶不已。不知果然否。審如是所聞。殆不可也。觀頃年血氣未定。頗好方術之說。讀醫經數年。嘗記釋者云。服黃連苦參。久而反熱。甚以爲不然。後乃信之。蓋五味入胃。各歸其所喜。故苦先歸心。酸先歸肝。甘先歸脾。辛先歸肺。鹹先

歸腎。入肝則爲溫。入心則爲熱。入肺則爲清。入腎則爲寒。入肝則爲至陰。而血氣兼之。皆爲增。其氣不已。臟氣有所偏勝。則必有所偏絕。黃連苦參性雖大寒。然其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。則心火勝。火勝則熱。乃其理也。眼疾之生。本於肝之熱。肝與心爲子母。夫心爲子。肝爲母。心火也。肝亦火也。腎孤臟也。人嘗患一水不勝。一火。今病本於肝。而久飲苦藥。使心有所偏勝。是所謂以火救火。命之曰益多。其不可亦明矣。夫藥所以療疾。其過也適。所以爲疾。聞比

初作時十已損其七八正宜飭藥慎護飲食以俟其自平非如決疣潰癰可以忽然一朝去也輒具以進惟留意而聽之無忽

秦觀與喬希聖論黃連書

○宋張杲醫說

黃連頭卽藥中黃連采頭鹽醃曬乾入茶最佳或熟

食亦美

明高濂野蔌品

黃連葉如小雉尾草經冬不凋

八閩通志

黃連九節者佳

溫州府志

黃連本草貴宣連今黃山所產是也時重川連而南楚辰播皆是愚在城步辰陽見人取之是雞爪類高

守恒曰邛州黃連長尺粗如筋或如小指雅闡巴皆小雞爪愚按雲貴連皆無毛諸深山連皆有毛生溪石上葉似小芹而冬不凋但其味更苦耳漏心生用餘可吳萸薑製

清皖桐方氏物理小識

草屬

菊葉黃連

一

菊葉黃連

菊葉黃連

黃連，臣禹錫等謹按蜀本圖經云：苗似茶花黃，叢生一莖，生二葉，高尺許，冬不凋。江左者節高若連珠，蜀

註本草補嘉祐

都者節下不連珠。今秦地及杭州柳州者佳。生平陽川谷及蜀郡泰山。今江湖荊夔州郡亦有之。而以宣城者爲勝。施黔者次之。苗高一尺已來。葉似甘菊。四月開花黃色。六月結實。似芹子色亦黃。二月八月採根用。

本草圖經

雲貴連皆無毛。諸深山連皆有毛。生溪石上。葉似小

草屬

雉尾葉黃連

一

雉尾葉黃連

芥而冬不凋但其味更苦耳

清曉桐方氏  
物理小識

雉尾葉黃連

黃連生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉  
尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始  
堪採本草圖經

黃連葉如小雉尾草經冬不凋八閩通志

庶物類纂

卷八

庶物類纂草屬卷之八目次

苦參

白頭翁

三七

玄參

## 苦參

一名水槐神農本草 一名苦藶同上 一名地槐別錄名醫  
 一名菟槐同上 一名驕槐同上 一名白莖同上 一名

虎麻同上

一名岑莖同上 一名祿白同上 一名陵郎同上

俗名忽賴賴

苦參

苦參陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有  
槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差  
患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲嘉祐補註本草

苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根  
黃色長五七寸許兩指麤細三五莖竝生苗高三二  
尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋  
其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花子五月  
六月八月十月採根暴乾用

一本草圖經

苦參有朝士苦腰重久坐旅十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此方書舊不載者有入病遍身風熱細癰痺痛不可忍連胸頸脣腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十

十九丸次日便愈

宋寇宗奭本草衍義

苦參七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒

豆而堅

明李東壁本草綱目

予一族子舊服芎藶醫鄭叔熊見之云芎藶不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又予姻家朝士張子通之妻因病腦風服芎藶甚久亦一旦暴亡皆予目見者又予嘗苦腰重久坐則旅距十餘步然後能行有一將佐見予曰得無用苦參潔齒否予時以病齒用苦參數年矣曰此病由也苦參入齒其氣傷

腎能使入腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩腰歲久亦病腰自後悉不用苦參腰疾皆愈此皆方書舊不載者

宋沈存中  
夢溪筆談

苦參苗高三二尺許葉極似槐春生冬凋其花黃白七月結實作莢子如小豆根極苦一名地槐一名水槐

八閩通志

苦參出封川木生大苦寒殺蟲

肇慶府志

### 白頭翁

一名野丈人

神農本草

一名胡王使者

同上

一名柰

何草

名醫別錄

一名老公鬚

藥性賦

俗名肥眉法柰

山城州

又名折葷異索烏

同上

又

名計異折伊法柰

州備前

又名紫拔忽賴古索

尾張州又名地莫哥法柰

信濃州

又名地哥法柰

同上又名捏哥古索

筑前州

白頭翁

白頭翁陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似蠱頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉

生莖頭如杏葉上有細白毛近根處有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蕊黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾嘉祐補註本草

白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蕊五月六月結實

其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大暖謹按一本作驗亦衝入本草圖經

白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排斥也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意宋寇宗奭本草衍義青囊

白頭翁處處有之謂之老公鬚根有白茸故名之

賦  
藥性

白頭翁狀似白薇葉生莖端上有白毛近根處有白

草正似垂白之翁

宋鄭夾漈昆蟲草木畧

白頭翁能殺蟲解毒根身俱用葉如生地黃但此根

白花節有白毛如草然故名

清朱鳳台醫學集要

山七

一名山漆

本草綱目

一名金不換

同上

山七

山七，被人言其葉左三右四，故名二七，蓋恐不然。或云本名山漆，謂其能合金瘡，如漆黏物也。此說近之。

金不換貴重之稱也。

明李東壁  
本草綱目

山七生廣西南丹諸州番峒溪山中，采根暴乾，黃黑色，團結者狀畧似白及，長者如老乾地黃，有節，味微甘而苦，頗似人參之味。或云試法以末，掺豬血中，血化爲水者乃真。近傳一種草，春生苗，夏高三四尺，葉似菊艾，而勁厚有岐尖，莖有赤稜，夏秋開黃花，蕊如

金絲盤紉可愛而氣不香花乾則吐絮如苦蕡絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍同上

此藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨卽嚼爛罨之卽止青腫者卽消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驥

竭紫鉢相同同上

三七根止血聖藥也近日有活種閩廣帶回者家中亦有此種葉如野蒿花黃而小極易生鮮者採葉搗爛跌打破碎者按上立止血疼過二二日卽愈又不潰爛真神草也收葉乾作末亦可治吐血衄血上衝者皆宜佐以治藥服之其功效備關於後治刀斧箭傷血出不止者嚼少許罨上卽止治婦人血崩者等遠近研一二錢白酒調服吃後四物湯加三七五分煎服治吐血用一錢或五分自嚼米湯下或用人參

五分煎服治腸風下血用四物湯加三五分煎服或空心用五分調酒服治杖瘡瘀血用一二錢嚼爛罨左破上再服一二錢免血攻心治產後血漏用一二錢研細水調服卽止治跌打青腫不消者用一錢嚼細塗患處卽愈治害眼十分重者用少許水磨調點眼眶內卽消治赤白痢疾用一二錢爲末米泔水調服治虎狼蛇咬用一二錢爲末酒調服嚼少許塗患處妙治受下蠱毒先吃少許毒卽返出治一切瘡毒癰疽疼不止者用一二錢爲末水調塗之立效明高濂遵

生八

三七一名金不換春生苗葉作岐尖莖有赤稜夏秋黃花如金絲盤紐可愛止血良藥肇慶府志

金不換三七天驗仙方三七產於南丹等州深山僻處谿洞險阻採取甚難土人得之珍重如金每莖上七葉下三根故名三七又名金不換專治血不歸經効最莫比治金刃箭傷及跌撲傷損血出不止自嚼少許罨患處治血漏崩量手遠近研末一二錢用淡白酒或米飲服一二次食或用四物湯加三七五分

煎服亦妙治吐血用一錢或五分自嚼米湯送下或八物湯加三七五分煎服腸風下血四物湯加三七五分煎服或空心嚼五分溫酒送下杖瘡或刀破瘀血取二七隨傷大小嚼罨患處卽愈末破先服一二錢亦使血不冲心杖後亦宜服之產後血污不止用一二錢碾末水飲調服卽止自嚼亦妙男婦誤中打傷青腫不消用少許嚼塗患處卽消男婦害眼十分沉重不開用木曆少許塗眼眶一宵卽愈男婦赤白痢疾用十二錢研末米泔水調服蛇虎傷用一二錢

研末酒調服嚼少許敷患處立愈治畏人下鹽毒先吃少許遇毒毒卽返出神効男婦生無名腫毒或癰疽等瘡疼痛不止用一二錢研細塗之疼痛立止或生瘡毒用醋磨塗立消明基久吾  
醫學彙函

三七南丹田州出而田州尤妙廣西通志

三七近自廣中移種來甚易繁治血亦効紹興府志

玄參

一名重臺

神農本草

一名玄臺

名醫別錄

一名鹿腸

同上

一名正馬

同上

一名咸

同上

一名端

同上

一名黑參

本草編目

一名逐馬

本草編目

一名遂馬

同上

一名鬼藏

本草編目

一名山麻

本草編目

青囊藥

性賦

玄參

玄參陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾卽紫黑新者潤膩合香用之俗呼爲馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾嘉祐補註

本草

王勿貞集

卷八

草屬

玄參

二

玄參生河間及寃句今處處有之二月生苗葉似脂  
麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結  
子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若  
竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長  
生青白乾卽紫黑新者潤膩一根可生五七枝三月  
八月九月採暴乾或云蒸過日乾本草圖經

余用玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以爲  
臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白一種明李東壁本草

東壁本草編目

陶隱居曰生河間川谷及寃句今仁和笕橋山陽近  
道亦有二月生苗高四五尺其葉有毛莖方而細色  
青紫葉似芝麻對生如槐柳尖長邊有鋸齒七月開  
花青碧八月結子褐色又有白花者莖方而大有節  
若竹色紫赤葉似烏藥七月開花白色或茄花色形  
似大薊花端叢刺刺端有鈎最堅且利八月結子黑  
色其根一株五七枚有腥氣七八月采傍根暴乾老  
根不用在地者中空或云地蠶食之故也明倪朱謨本草彙言

子黑色、八閩

通志

玄參莖似人參而長、紫赤色葉如掌根甚黑微香、江陰

縣志

玄參卽山麻

青囊藥性賦

玄參二月生苗高四五尺莖方而大作節若竹色紫赤有細毛葉生枝間四四相值形似芍藥七月開花白色或荷花色形似大菊花端叢刺刺端有鈎最堅且利八月結子黑色一種莖方而細色青紫莖似脂麻對生又似槐柳尖長邊有鋸齒七月開花青碧八

月結子黑褐根都科生一根五七枚生時青白乾卽紫黑宜三八月采

清劉若金本草述

馥草卽玄參葉似芝麻又如槐柳青紫細莖七月開花青碧色隨結黑子亦有白花莖方大紫赤色而有細毛其節若竹高五六尺葉如掌大而尖長邊如鋸齒其根亦尖長生青白乾卽紫黑微香可入藥

清陳淏子

秘傳  
花鏡



